傷寒直格論

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

傷寒直格論

葛雍編

本館據古今醫統正
脈全書本排印初編
各叢書僅有此本

傷寒直格序

習醫要用直格。迺河間高尙先生劉守眞所述也。守眞深明素問造化陰陽之理。比嘗語予曰。傷寒謂之大病者。死生在六七日之間。經曰。人之傷於寒也。則爲病熱。古今亦通謂之傷寒熱病。前三日太陽陽明少陽受之。熱壯於表。汗之則愈。後三日太陰少陰厥陰受之。熱傳於裏。下之則痊。六經傳受。自淺至深。皆是熱證。非有陰寒之病。古聖訓陰陽爲表裏。惟仲景深得其旨。厥後朱肱奉議作活人書。尙失仲景本意。將陰陽字釋作寒熱。此差之毫釐。失之千里。而中間誤罹橫夭者。蓋不少焉。不可不知也。予語守眞曰。先生之論如此。何不闢此說以暴耀當世。以革醫流之弊。反忍而無言何邪。守眞曰。世之所集各異。人情喜溫而惡寒。恐論者不詳。反生疑謗。又曰。欲編書十卷。尙未能就。故弗克耳。今太原書坊劉生鋟梓以廣其傳。深有益於世。如宵行冥冥迷不知徑。忽遇明燈巨火。正路昭然。若有執迷而不知信行者。固不足言。而聰明博雅君子。能於此者。原始反終。研精覃思。則其所得。又何待予之喋喋也。

傷寒直格論卷上

臨川 葛雍編

習醫要用直格

十干

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

臟腑配合

甲膽 手少陽　乙肝 手厥陰　東方木也　丙小腸 手太陽　丁心 手少陰　南方火也

庚大腸 手陽明　辛肺 手太陰　西方金也　壬膀胱 足太陽　癸腎 足少陰　北方水也

戊胃 足陽明　己脾 足太陰　中央土也

凡先言者.爲剛爲陽.爲兄爲腑.主於表.後言者.爲柔爲陰.爲妹爲臟.主於裏也.

十二支

寅卯辰　巳午未　申酉戌　亥子丑

臟腑經絡配合

寅三焦 手少陽　卯大腸 手陽明　辰小腸 手太陽　巳包絡 手厥陰　午心 手少陰

未肺 手太陰　申膽 足少陽　酉胃 足陽明　戌膀胱 足太陽　亥肝 足厥陰

子腎 足少陰　丑脾 足太陰

手足三陰三陽者。十二經絡之名也。

手足經絡配天地四時

寅卯辰。手三陽。天陽春也。巳午未。手三陰。天陰夏也。

申酉戌。足三陽。地陽秋也。亥子丑。足三陰。地陰冬也。

合主表裏 合音甘入聲。餘不音者。並如字。

太陽少陰合。陽明太陰合。小陽厥陰合。足與足合。手與手合。如足太陽膀胱水合足少陰腎水。陽爲腑。屬表。陰爲臟。屬裏。

陰陽臟腑

肝與膽。厥陰風木也。心與小腸。少陰君火暑熱也。包絡及三焦。少陽相火也。（此爲陽之臟腑。）

脾與胃。太陰濕土也。肺與大腸。陽明燥金也。腎與膀胱。太陽寒水也。（此爲陰之臟腑。）

脾。心。肝。肺。腎。兼包絡。一名命門。爲六臟。

胃。小腸。膽。大腸。膀胱。兼三焦。爲六腑。

經絡病證

絡者。正經脈道之旁小絡。如支絡。絲絡之類也。皆連行氣血之脈也。各宗於本經焉。

手太陰肺病。則肺脹滿。膨膨而喘欬。缺盆痛。欬逆上氣。喘喝煩心。胸滿臑臂內前廉痛。甚則交兩手而瞀。

肩背痛。而汗出。虛則氣不能報息。小便數變。

十二經始於肺經。故其序如此。喝乙介切。噦聲也。

缺盆者肩前臑內陷中也。臑音如。從肩至肘。通名曰臑。自手至腕。通名曰臂。癃窮眸也。昏音莫。眼黑也。昏也。言氣亂。兩手相交。而昏瞀也。不能報息俗所云氣少不能接續也。數音朔。頻也。

手陽明大腸病。則齒痛頤腫。虛則目黃口乾。鼽衄喉痺。腹中雷鳴。氣常衝胸。喘不能久立。肩前臑痛。大指次指不能爲用。

頤音拙。面秀骨。目下起骨也。鼽音求。清涕也。衄音濃。入聲。鼻出血也。不能爲用言屈伸不能如意也。

足陽明胃經病。則洒洒振寒。善伸數欠。或惡人與火聞木聲。則惕然而驚。心欲動。獨閉牖而坐。處欲登高而歌。棄衣而走。賁嚮腹脹。罵詈不避親疎。氣甚則身前皆熱。消穀善饑。尿色黃。氣虛則身前皆寒。慄胃中寒。則腹脹滿。實胸腨當心而痛。上支兩脅。鬲咽不通。食飲不下。狂瘧溫淫。汗出。鼽衄。口喎脣胗。脛腫喉痺。腹水腫脹。膝臏腫痛。循胸傍。過乳衝。股伏兔。骭外廉。足跗上皆痛。中指不能動。

振動搖也。善伸自然能也。數欠頻呵欠也。心欲動不寧也。閉戶爲惡人兼多驚。賁音奔。勇猛也。嚮向同。熱炊也。慄戰慴也。支持也。固也。淫亂也。臏音牝。膝骨也。股腿髀肉。伏兔膝上起肉也。骭戶當切。乃脛骨也。跗音夫。足面動脈也。

足太陰脾經病。則舌本強。食則嘔。腹脹。溏泄。瘕水閉黃疸。中滿食減。善噫。身體皆重。得後與氣快然而衰。甚則肌肉痿。足不收行。善瘈。脚下痛。四肢不舉。大小便不通。虛則腹脹。腸鳴飧泄。食不化。舌本痛。不能動

搖食不下煩心心下急痛寒瘧溏洩水下黃疸不能臥股膝內腫厥大指不用

本舌根也強去聲不和柔也溏大便稀薄瘕音假肚中結病也水閉言水不宣通也噫衣令切轉氣也後與氣言下氣也痿於爲切痺病也契合也行則不覺脚相揩也殮音孫食也厥其也不能運用也

手少陰心經病則胸中痛脅支滿脅下痛膺背肩胛間痛兩臂內痛甚則嗌乾心痛渴而欲飲身熱膚痛煩心譫妄虛則善悲時眩仆胸腹脅下與腰背相引而痛目黃脅痛臑後廉痛掌中熱

譫音占亂言也妄見虛妄而言也眩玄去聲眩暈昏亂也仆音付卒然而倒也

手太陽小腸經病則嗌乾頷腫不可回顧肩似拔臑似折虛則少腹控卵引腰脊上衝心痛耳聾目黃頰頷腫肩臑肘臂外後痛

嗌音亦氣系也少腹臍下兩旁也控引也卵陰丸也

足太陽膀胱經病則顛頰腦中戶痛衝頭目似脫項似拔腰似折髀不可以曲腘如結腨如列虛則痔盛則瘧狂巔疾頸頂顱頂腦戶中痛目出黃泪項背腰脊尻後腘脚背痛小指不爲用

衝頭痛腦後橫衝眉間痛也腘曲脈後也結括也腨市兗切一名臗俗所謂脚肚也巔頂也尻居刀切後陰後分合處也大而言之臃也

足少陰腎經病則饑不欲食面黑如漆咳唾則有血喝喝而喘坐而欲起目瞧瞧如無所見心懸如饑腹大脛腫喘咳身寢汗出憎風虛則腹滿身重濡泄寒瘍流水腰股痛發腘腨促膝不便煩寃足痿清厥意不樂大便難善恐心惕如人將捕口熱舌乾咽腫上氣嗌乾而痛心煩而痛黃疸腸癖脊臀股內後廉痛

痿厥嗜臥。臥不安。足下熱而痛。

喝乙介切。瞎音荒。濡潘泄也。寒瘍俗言煉瘡。不便不利便也。煩冤心悶亂不寧。痿痺弱。清厥手足清冷而厥逆也。痿厥欲臥而不安也。腸癖下利也。

手厥陰心胞絡病。則手心熱。臂肘攣急。腋腫甚則胸脅支滿。心澹澹大動。面黃目赤。喜笑不休。虛則煩心。心痛。掌中熱。

澹澹水搖動貌。

手少陽三焦病。則耳聾渾渾焞焞。虛則目銳眥痛。耳後肩臑肘臂外皆痛。小指次指不能爲用。足厥陰肝經病。則腰不可俯仰。丈夫癩疝。婦人少腹腫。胻脅痛。引少腹甚則嗌乾。面塵善怒。忽忽眩。痛巔疾。目赤腫痛。耳聾頰痛。虛則目瞕瞕如無所見。無所聞。善恐。如人欲捕之。胸滿嘔逆。洞泄狐疝。遺尿。癃甚。腋下曰脅。脅下骨爲肋。脅肋之下曰胠。音區。面塵面如浮塵。忽忽昏亂也。眩頭目眩暈也。洞疾流也。狐疝言狐者。疝氣之變化隱見。往來不可測。如狐也。遺尿癃閉。小便癃閉而病疲懨也。

內外八邪

外有風寒暑溼。內有饑飽勞逸。逸非奔逸之逸。乃逸豫怠惰而生病也。與勞相反。故經曰。勞者溫之。逸者行之。使氣血運行也。西山記曰。久勞則安閒以保其極力之處。久逸則導引以宣積滯之氣。或作役者誤也。

內外病生四類

一者因氣變動而內成積聚癥瘕癲狂驚癎之類也。

癥音貞・堅積・瘕音假・血氣聚也・多喜曰癲。多怒曰狂。

二者因氣變動而外成癰腫瘡瘍痂疥疽痔掉眩浮腫目赤。瘭膞腑腫痛痒之類也。

不因一時所傷而病。乃久以漸積臟腑變動興衰而病者。是曰因氣變動也。臟腑和平。卒然而卽成病者。是曰不因氣之變動也。淺而大曰癰。深而惡曰疽。掉動搖也。瘭音漂・赤丹留毒火瘭也。

三者不因氣之變動而病生於內。則留飲僻食饑飽勞損宿食霍亂悲恐想慕憂結之類也。

僻邪也・霍亂上吐而下瀉也・

四者不因氣之變動而病生於外。則瘴氣鬼魅蟲蛆蠱毒蜚尸鬼擊衝薄墜墮斫射刺割捶扑打探鼓拉觸抹風寒暑溼之類也。

蜚去聲・獸也・通言獸所傷人・

九氣

怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收。炅則氣泄。驚則氣亂。勞則氣耗。思則氣結。

炅音桂・熱也・舊音耿・非・人怒則氣逆。甚則嘔血及飧泄。故氣上也。○人喜則氣和而志達。榮衛通利。故氣緩。緩猶和也。故令人氣散也。○悲則心緊急。肺布葉舉而上焦不通。榮衛不散。熱氣在中。故令人氣消也。○恐則精却。却則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。故氣下行也。○寒則腠理閉而氣不行。故氣收也。○炅者熱也。熱則腠理開而榮衛通。汗大泄。故氣泄也。○驚則心無所倚。神無所歸。慮無所定。故

氣亂也。○勞則喘且內外皆越。故氣耗也。越散越也。○思則心有所存。神有所歸。正氣留而不行。故氣結也。結者。滯而不通也。

五邪

母乘子曰虛邪。乘勝也克也。　如心火熱乘脾土也。

子乘母曰實邪。　如肺金燥乘脾土也。

妻乘夫曰微邪。　如腎水寒乘脾土也。

夫乘妻曰賊邪。　如肝木風乘脾土也。

自病曰正邪。　如脾土自病溼也。

五臟腑同法各以類推。

五邪微甚

微實正虛賊從微至甚也。

此亦大略之言。細而推之。各有微甚。

十干夫婦配合成五運

甲己合爲（土運）　甲剛木克己柔土爲夫婦成土運。

乙庚合爲（金運）　乙柔木嫁庚剛金。

丁壬合爲（木運）　丁陰火配壬陽水。

丙辛合爲（水運）　丙陽火娶辛柔金
戊癸合爲（火運）　戊陽土娶癸陰水

五運太過不及

陽剛夫爲太過　陰柔妻爲不及

此其略也凡六十四年而周甲子其中有歲運同司天曰天府同歲支曰歲會孟年同曰支德符歲運同司地剛爲同天符柔爲同歲會凡此二十九歲太過司天克之曰天刑及年前大寒交氣日反時程與運程爲夫婦者曰程德符皆非太過不及乃年運之氣也申子辰年寅初交巳酉丑年巳初交寅午戌年申初交亥卯未年亥初交氣也

十二支應六氣三陰三陽

六氣爲本三陰三陽爲標

子午少陰（君火）暑　丑未太陰（溼土）
寅申少陽（相火）主大熱　卯酉陽明（燥金）
辰戌太陽（寒水）　巳亥厥陰（風木）

六氣有餘不足

孟少仲平季多也

內經以寅申巳亥四孟爲一陰一陽也子午卯酉四仲爲一陰一陽也辰戌丑未爲三陰三陽也然陽

爲先故主虛無變化輕微而少陰爲後故主形體安靜重濁而多也故風火動亂至陽爲先居孟未甚爲少寒溼肅靜至陰爲後居季巳甚而爲多燥熱各得乎中故居仲而平也註曰氣有多少是言六氣形有旺衰言五運也

六氣

寒暑燥溼風火

五運應五臟主病

諸風掉眩皆屬(肝木)　諸痛痒瘡瘍皆屬(心火)

諸溼腫滿皆屬(脾土)　諸寒收引皆屬(腎水)

諸氣膹鬱病痿皆屬(肺金)

膹悶亂也・鬱結滯壅塞也・

六氣爲病

諸暴彊直支病耎戾裏急筋縮皆屬於(風)乃厥陰風木肝膽之氣也・諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大彭之如鼓有聲癰疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂昏鬱腫脹鼻塞鼽衄血泄淋悶身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄飧泄皆屬於(熱)少陰君火・乃眞心小腸之氣也・

注泄也下迫後痛裏急痛也結核言肌肉結鞕如果中核也溢上出泄下出鰋血汗也鰋音慢・衄音肉鼻出血也・

諸痙強直。積飲痞隔中滿。霍亂吐下。體重肘腫。肉如泥而按不復起。皆屬於(溼)也。太陰溼土。乃脾與胃之氣也。

痙其井切。似風狂病也。一名曰痙。尺至切。積飲水畜不散也。痞否腸胃氣液血脈否閉不能運行。謂之痞也。水穀傳化。阻隔失常。則曰膈肘。音附。

諸熱瞀瘛。筋惕悸動。搐搦瘈瘲。暴瘖目眛。躁擾狂越。罵詈驚駭。肘腫疼酸。氣逆上衝。禁慄如喪神守。嘘嘔瘡瘍。喉痺耳鳴及聾。嘔涌溢食不下。目眛不明。暴注瞤瘈。暴病暴死。皆主於(火)也。少陽相火。乃心包絡三焦之氣也。

瘛尺至切。瘖音痤。啞狂躁。亂發狂也。禁慄。寒戰如喪心神之守。嘘音帝。瘲音縱。兒病也。瘈音契。小兒病也。

諸澁枯渴。乾勁皴揭。皆屬於(燥)。陽明燥金。肺與大腸之氣也。諸病上下。所出水液。澄徹清冷。癥瘕癭瘤。堅痞腹滿。急痛下利。青白食已不饑。吐利腥穢。屈伸不便。厥逆禁固。皆屬於(寒)。太陽寒水。乃腎與膀胱之氣也。

論脈

三部九候

夫三部者。寸關尺也。(寸)應天爲上部。(關)應人爲中部。(尺)應地爲下部。九候者。各浮於天。沉於地中爲人也。

脈位輕重

高骨旁動脈爲關。中指正按高骨之端是也。俗不明其正理。但以穩於下指而差高骨於頭中指之間。如此則三指各差在本位之後半部耳。或以頭指正在高骨。或更在高骨之後者。此不通脈之正理也。便使心精了然。既下指失其本位。則亦無以知其爲何病也。

關前至魚際爲寸。是名陽位。一名寸口。正在東關前堂骨後。赤白肥肉際。宛中骨縫陷中。可容一豆者。是乃名魚際者也。

關後爲尺。是名陰位。關後至本經于太陰所入爲合。在肘內。大約紋動處是名尺澤。長一尺。故名尺也。陰陽兩者之間。則名關。三部長三寸。以應三寸。凡男左女右。以中指與大指相接如關度中指上仄中節。兩橫紋之際。爲一寸。凡取穴以此爲則。而脈位之尺寸亦應此也。凡寸脈主自心胸上至頭也。而關脈主中心胃至臍也。尺脈主下臍以至足也。

左寸主心及小腸。君火左關主肝膽。風木左尺主腎膀胱。寒水右寸主肺大腸。燥金右關主脾胃。溼土右尺主命門三焦。相火所以然者。左手爲陽。陽爲君。面南布政。而陽始於子水。以一歲六氣正位分之。則應於亥正至丑終氣衰也。水之位主於左尺之脈。脈從尺入寸。故水生風木於左關應丑至卯初之氣也。木生君火於左寸。陽道已成。故爲君火。猶乾始於子而終於巳也。自卯正至巳二之氣也。君上而臣下。陽進而升。陰退而

降。故右手爲陰始於午火。火面北而受氣。自巳至未正三之氣也。三焦爲正火。主右尺之脈。相火生溼土於右關正位。以至酉四之氣也。溼土生金於右寸應酉至亥。五之氣也。又主左尺水。周而復始也。及夫男左女右爲夫婦。故左寸君火克右寸之金。左關木克右關之土。左尺水克右尺之火。及夫命門者。右腎也。屬火不屬水。乃手厥陰心包絡之藏。舉世皆言心包絡之藏有名而無形。由不明理也。夫三焦乃水谷傳化之道路。自口至胃上口爲上焦。下至胃下二腸分處爲中焦。下至傳化出處爲下焦。通曰三焦。今俗妄言無形狀。而空有名者誤也。且如人從頭數至足。皆不謂之人。則亦安可言人無形狀耶。全身而言之。固名人也。且血脈盡皆環貫臟腑。運行周身。如果無命三焦之形體。則何得氣血運行之道路耶。

各浮於腑而沉於臟中而和緩者胸也。

脈在肌肉以上曰浮。在肌肉之下曰沉。或以肺養皮毛。心養血脈。脾養肌肉。肝養筋膜。腎養骨髓。以此浮沉而分五臟之脈者。言脈位則可。爲用則有失治病之道也。

脈息遲速

呼爲陽以應天。脈再動以應春夏。吸爲陰以應地。脈再動以應秋冬。

氣出爲呼。入爲吸。再兩次也。動至也。

或潤以太息而又一動者。以應長夏。脾土故一息四至五至皆爲和平。

太息言呼吸或有長者也。長夏六月也。○平和言爲平人不病之脈。

謂一歲四時五行俱備也。五至以上曰數。不滿四至曰遲。數過備者死。不及一至者亦死。

數爲熱。遲爲寒。過備八至之上也。是以平人之息合病人之脈也。故經曰。常以不病調病人。由是小兒八至爲和平。十至有熱。六至爲病寒也。自六歲以下通曰。以此三歲之法。人小則脈如數長短亦然。

七表

浮芤滑實弦緊洪。此名七表。爲陽。少陽之數七。

浮脈者輕手乃得。重按之不見。脈見諸陽。爲表熱。諸陰爲表寒。

脈動於肌肉之上也。浮屬陽。爲病在表。一名府病。或傷風自汗脈浮。爲表熱。遲緩之陰者表寒。

芤脈者浮大而軟。按之中央虛兩邊實也。

芤主熱甚失血。寸芤則吐血。微則衄。甚則俱出。關芤則胸癰下血。尺芤則大便血。微則小便血。甚則俱下。

滑脈者不澁也。多與實數相兼。則爲病熱。或亡液血衰。雖熱而反濇也。或滑兼遲。則爲病寒。平而滑者腎之本脈。

實脈大而長。浮沉皆得而數。陽熱也。

弦脈者輭虛而滑。端直而長也。弦主於風。或如琴弦。或如張弓者。弦之太過也。

緊者不緩也。或如轉索。或如切繩者。緊之太過也。

緊脈主痛多與實數相兼。則爲熱痛。或短緊微細。陰脈相兼者寒痛也。

洪脈者。極大而數。舉按者。指實熱之極甚者也。

八裏爲陰。象易少陰之數八。微沉緩濇遲伏濡弱也。

微脈者。若有若無。極細而軟也。多兼於遲。主於陰寒。然或熱甚。汗泄。吐利。氣而損虛者。或陽厥極深者。或熱極將死脈欲絕者。脈亦有微沉緩濇遲伏濡弱諸陰脈見也。不寒便言爲寒。須以標本明之。

先病爲本。根本也。後病爲標。梢末又爲病之氣爲本。受病之臟腑經絡爲標。世俗至此更不明其陽極熱證。但以執其陰脈爲寒。內外急救於陽。則殘陰暴絕而反致死亡者。不少也。且察色聽聲。問證切脈。爲神聖功巧。別病之四法。而脈最爲下。則安可執巧之一法。而去其神聖功之三法耶。及夫八裏之脈。皆有此義。以微脈居先。故於此總而言之也。

沉脈輕手不見。重切之乃得。動在肌肉之下。其位屬陰。爲病在裏。一名臟病。或畜於胸及膀胱者。雖爲腑病。其脈亦沉。則皆宜下之。由十二臟腑俱在裏。而經絡皆在表也。大抵但以浮爲表。沉爲裏。然雖臟爲陰主裏。腑爲陽主表。其于病脈之浮沉。有所不拘也。故太陰脾臟之病。腹滿而脈浮者。桂枝攻於表也。夫脈沉數爲裏熱。沉遲爲表寒。餘脈皆倣此。

或裏熱吐利。氣液損。虛損或陽厥極深。或熱極將死者。亦皆見諸陰脈沉。切宜審之。不可妄以施治。

緩脈者。縱緩而不急。似遲而小疾。緩而遲爲寒。緩大而長爲熱。

當傷風自汗。或自汗過多。亦爲遲緩熱更甚也。

濇脈者。澁而不滑也。或如刀刮竹。或濇而止住者。濇之太過。主液血衰。

由汗泄吐利。或血溢血泄。或熱盛耗液。而成燥也。一曰濇。主心痛。血少故也。以心養血。

遲脈者。一息四至以下也。遲爲病寒。然熱盛自汗吐利過極。則亦爲遲也。

氣液損虛。故脈遲而不能數。

伏脈者。脈附於骨沉之甚也。伏主水畜於內。積飲不散也。伏位屬陰。在裏深也。病之寒熱。以隨陰陽別之。

附切近也。水畜於內。一名留飲。

濡脈者。按之似無。舉之無力也。有似微弱多兼於遲。主於極冷。然或熱洩後。或熱極將死者。脈亦濡弱。須以外證標本參之。

弱脈者。軟虛而無力也。弱之虛冷。必兼微與遲也。然而傷風中暑。熱甚而自汗大出。則亦緩弱而遲也。

四時平脈

春弦。　夏洪。一日數。一日鉤。秋毛。一日濇。一日浮。冬石。一日沉。

六步主位平脈

初之氣。自大寒日至春分。厥陰風木之陽用事而氣微。

故曰冬至後日甲子少陽主。然冬至甲子。斯無常準。以大約分之。一月如在冬後。卽大寒交初氣之分也。一歲六周甲子。以應六氣。下皆倣此。一氣。正月二月也。

脈乍大乍小乍短乍長。時物及風木之象也。

二之氣。春分至小滿。少陰君火之位。陽氣淸正。在兩陽合明之間。故又云陽明主。

脈弦也。
三之氣。小滿日至大寒。少陽相火之位。陽氣萬物皆盛。故亦云太陽主。
脈洪大而長。天氣萬物。人脈與造化同。
四之氣。大暑日至秋分。太陰溼土之位。天氣尚盛。而夏後陰已用事。故云太陰主。此三陰三陽與六氣標本之陰陽異矣。
脈緩大而長。或云緊大而長者。傳寫之誤也。溼土主緩大而長。燥金主緊細而短。濡以萬物乾溼明可見焉。時溼土盛膚腠開通。汗液時泄。故脈雖大長而力緩不能緊也。○至秋後氣衰。寒涼乍閉。故雖微細而力緊也。
五之氣。秋分日以至小雪。陽明燥金之位。氣衰陰盛故。又云少陰主也。
脈緊細而微
終之氣。一曰六之氣。小雪日以至大寒。太陽寒水之位。陰極而終盡。天氣之所收隱。故曰厥陰主厥者盡也。
脈沉短以敦。敦厚也。萬物收藏在內。寒氣閉塞。而膚腠。
氣液不能散越。故脈沉短而反有力。敦厚而如石也。
凡四時六位平脈大退。則時氣有餘而爲病。
如春弦太過。則風爲病。

不及者氣衰而爲病。

四時脈微見爲平。此言過微也。如秋脈微而兼夏脈之類也。

反見他脈者。他氣有餘而來爲病也。

遲爲寒而數爲熱之類也。

結代促

結脈者。遲緩而時一止爲陰也。主陰盛發燥煩滿。或陽厥極深。以至身冷脈微欲絕而緩弱。時一止者。亦胸煩燥。此止爲熱極而非寒也。皆須以標本明之。

促脈者陽也。數而時一止也。主聚積氣痞憂思所成。亦或熱劇失下。則令脈促下之則平也。

代脈者。主緩弱而無力不能動。因而復動。病必危而死。

跌陽脈

跌陽脈者。胃土之脈也。跌陽脈遲而緩者。胃氣如經也。

動在足跌陽之經。故曰跌陽一日衝陽者。陽明所過之原。過者衝也。如經如本經之常脈。

滑爲胃實。緊爲脾強。浮而滑者。浮爲胃虛。滑則爲噦。浮而鼻中燥者。必衄也。沉爲胃實。上本下故也。數爲消穀。胃熱故也。緊則難治。蓋四時五臟皆以胃爲本。緊燥盛而土溼氣衰。故曰難治。浮而大者。氣實血虛也。氣爲陽。血爲陰故也。浮而濇者。胃虛下利也。去液故澁。伏而濇者。伏則吐逆水穀不化。內溼故也。濇則氣不下食。脈不出則身冷膚鞭。

太谿脈

太谿者腎水之脈也動於左足內踝下後跟骨下陷中足少陰腎水之胃故曰大浮也太谿脈則腎氣如經也弱則微煩濇則厥逆微厥也

死生脈候

陽病熱證不退反見陰脈者死脈近於絕故也汗後熱退而見陰脈者愈○陰陽證脈平愈○傷寒咳逆上氣脈散者死形損故也○脈浮而洪身汗如油喘而不休水漿不入形體不仁不仁者不和也○乍靜乍動命絕也○汗出髮潤喘不休者肺先絕也○陽反獨留體如烟熏直視搖頭心先絕也

唇吻音穩反青四肢槩習者肝先絕也槩丑入切汗出也習水流不絕此言汗不止也環口黧黑柔汗發黃者脾先絕也柔虛也○溲便遺失狂言直視者腎先絕也溲小便便大便○寸口脈陰陽俱緊盛寸口卽氣口此言三部關前爲陽關後爲陰○大汗出不解者死脈陰陽俱虛熱不止者死汗後身涼息微見陰脈而靜者愈身熱喘麤見陽脈而燥者死汗不勝病也○汗後微熱不解者病不可便言死也脈如轉索者當日死○譫語身微熱脈浮大手足温者生欲作大汗故也俗作好汗○脈暴出者死陰衰欲絕而陽暴獨勝則脈暴出少間陰氣先絕則陽氣後竭而死矣

逆冷脈沉細者不過一日死死證多矣以至危極則無越此矣

傷寒直格論卷中

習醫要用直格

傷寒總評

傷寒六經傳受.

〔經言〕寒傷形.寒傷皮毛.寒傷血.寒傷榮.然寒主閉藏而腠理閼密.陽氣怫鬱.不能通暢.怫然內作.故身熱燥而無汗.故經曰.人之傷於寒也.則爲病熱.又曰.夫熱病皆傷寒之類也.內經既直言熱病者.言一身爲病之熱氣也.以至仲景直言傷寒者.言外傷之寒邪也.以分風寒暑溼之所傷.主療不同.故只言傷寒而不通言熱病也.其寒邪爲害至大.故一切內外所傷.俱爲受汗之熱病者.通謂之傷寒也.一名大病者.皆以爲害之大也.又春曰溫病.夏曰熱病.秋曰溼病.冬曰傷寒.傷寒者.是隨四時天氣.春溫夏熱秋溼冬寒.爲名.以明四時病之微甚.及主療消息.稍有不等.大而言之則一也.非爲外傷及內病有此異耳.或云.冬伏寒邪於肌膚骨肉之間.至於春變爲溫病.夏變爲熱病.秋變爲溼病.冬變病爲正傷寒病者.及名冒其寒而內生怫熱.熱微而不卽病者.以至將來陽熱變動.或又感之而成熱病.非謂伏其寒氣而反變寒爲熱也.經曰冬傷於寒.春必病溫.亦其義也.亦有一時冒寒而便爲熱病者.或感四時不正乖戾之氣.或隨氣運興衰變動.或內外諸邪所傷.或因他病變成.或因他人傳染.皆能成之.但以分門隨證治之耳.〔經言〕此六經傳受.乃外傷於寒而爲熱病之大略.主療之要法也.

大法曰．傷寒一日．太陽受之．故頭項痛．腰脊強．
此足太陽膀胱之經也．故與〔經言〕五日足少陰腎水爲其表裏．或言爲手太陽者誤也．此六經之證也．或以此直云傷寒不傳手經者．亦誤也．豈不詳熱論云．五臟六腑皆受病．又刺熱篇皆言五臟熱病．但以熱病多于足經而其病甚．少于手經而其病微．且與足經微爲兼證．汗下之治．但分表裏故不單言手經．而但寄於足經而已．若針刺則本經補瀉．各分五臟手足之經矣．
二日陽明受之．故身熱目疼鼻乾不得眠也．
三日少陽受之．故胸脅痛而耳聾．
四日太陰受之．故腹滿而咽乾．
五日少陰受之．故目燥舌乾而渴．
六日厥陰受之．則煩滿囊縮．
或言傳手厥陰包絡相火．則水火既濟而愈．傳足厥陰肝經則土敗木賊而當死者．妄說也．此〔經言〕足厥陰肝經之證也．
大法曰．前三日三陽病在表．故宜汗之．
汗洩熱退．身涼而愈．
後三日三陰病在裏．故宜下之．
下退裏熱．則怫熱宣通．汗出氣和而愈也．亦有內熱下盡無汗氣和而愈者也．或者曰．前三日寒在表

者誤也。此皆熱證也。

或未愈者。再經衰之。七日太陽病衰。自此以下皆言病自衰滅頭項少愈。八日陽明病衰。身熱少愈。九日少陽病衰。耳能微聞。十日太陰病衰。身熱少愈。腹滿如故。十一日少陰病衰。渴止不滿。以言腹不復滿舌乾已而嘿。十二日厥陰病衰。囊縱少腹微下。大氣皆去。言大病熱氣散去病則瘳音抽愈也矣。

此亦大略言之耳。傷寒傳受不必拘此。但以明其諸證而如法治療耳。

裏外傷

如得病脈便沉。而裏病表和者。內傷也。脈浮而表病裏和者。外傷也。

病在身體四肢爲表病　病在胸腹之內爲裏病。

表裏證

身熱爲熱在表。　言皮膚壯熱而反增寒。非謂自發熱燥也。

引飲煩渴或小便黃赤。爲熱在裏。身熱飲水。或小便黃赤。爲表裏皆有熱。身涼不渴。小便清白。則表裏皆無熱。

不言爲寒者。蓋表裏熱微。則亦有身表不熱而裏亦不渴故也。

渾身疼痛拘急。表熱惡寒而脈浮者。皆爲熱在表也。引飲譫妄。腹滿實痛。發熱而脈沉者。皆爲熱在裏也。

胸脅痞痛。或嘔而寒熱往來。脈在肌肉不浮不沉。則邪熱半在表半在裏也。

夫邪熱在表而淺。邪微而畏正。故病熱而反增寒也。寒則腠理益閉而怫熱益加故也。邪熱在裏而深。邪

甚則不畏於正。物盛其極。故不惡寒而反自惡熱也。半在表半在裏。進退無常。則寒熱往來也。寒多爲表多。脈稍浮。熱多爲裏多。脈稍沉也。諸病寒熱並同。惟瘧疾反此。由表之正氣與邪熱幷之於裏。表氣虛而裏熱實。亢則害承乃制。故裏之火熱極甚而反兼寒冰之化制之。故病熱極而反寒戰也。臨汗而戰及諸戰皆然。寒戰爲裏熱表虛故也。飲水而脈微不見也。裏之正氣與邪氣幷出於表。則表熱裏虛。是以煩熱汗出而脈浮也。經以熱幷於裏之陰分則爲陰勝而發寒。熱幷於表之陽分則爲陽勝而發熱也。俗未知其爲表裏之陰陽。而妄爲寒熱之陰陽。故皆失內經之本旨也。夫傷寒之寒熱者。惡寒爲表熱裏和。故脈浮。發熱爲裏熱。表氣不虛。故發熱而脈沉實也。氣幷不幷。故寒熱相反而有微甚也。熱幷則甚。不幷則微也。

主療

傷寒表證當汗而不可下。

反下之。則畜熱內餘而成結胸。或爲虛痞。懊憹喘滿。腹痛。下利不止。發黃。驚狂。班出。諸熱變證危而死矣。

裏證當下而不可汗。

反汗之。則熱甚發黃。驚狂。班出。譫妄而喘悶亂。危極而死矣。

半在表。半在裏。則宜和解

相和通解表裏也。

不可發汗吐下。妄治之則有前諸證。

在上則涌音湧吐也之。

言病在高上。如胸滿而嘔。或眩。脈關前緊甚者。宜瓜蒂散吐之。

在下者洩之。

言蓄熱下焦。則承氣抵當之類洩之。皆隨病所在攻之。

傷寒無汗。表病裏和。則麻黃湯汗之。或天水散之類亦佳。

身熱惡寒無汗。脈浮緊而數者。

表不解。半入於裏。半尙在表者。小柴胡湯主之。或天水涼膈二藥各一服。合同服之尤佳。表裏之熱勢俱甚者。大柴胡湯微下之。更甚者。大承氣湯下之。

表雖未罷。而裏證已甚。若不下之。則表熱更入於裏。而裏熱危極。宜以大柴胡大承氣下之。雙除表裏之熱。則免使但下裏熱。而下後表熱乘虛。又襲于裏。而生結胸及痞諸病之類也。

表熱多。裏熱少。天水一涼膈半以和解也。

煎涼膈半服。調天水一服。上下同法。

裏熱多。表熱少。未可下之者。涼膈一天水半調之。勢更甚者。小承氣湯下之。表證罷。但有裏證者。熱傳于裏也。調胃承氣湯下之。但除裏熱也。凡此諸可下之。言大柴胡三承氣諸下證通宜三乙承氣下之。善能開發峻効。而使之無表熱入裏。而成結胸及痞之衆病也。

發汗不解。下證前後。別無異證者。通宜涼膈散調之。以退其熱。便無熱甚危極也。除此之外。遠勝小柴胡湯。兩感倣此而已。

但隨表裏微甚而以調之。兩感謂一日太陽與少陰兩證俱見。二日陽明與太陰。三日少陽與厥陰俱病。前六經之證是也。

傷風自汗。表病裏和者。桂枝湯解肌。

無汗爲傷寒。不可服桂枝湯　有汗爲傷風。不可服麻黃湯。

半在表。半在裏。脈在肌肉而半入于裏白虎湯和解之。病在裏。脈當沉也。大承氣湯下之。　一法無間風寒暑溼。有汗無汗。但有可下諸證。或表裏兩證俱不見。而病日深。但目睛不了了者。昏昧不精明或腹滿實痛者。或煩渴。或譫妄。或狂燥喘滿者。或畜熱極深而將死者。通宜大承氣湯下之。或三乙承氣湯下之。尤良。傷寒大發汗。汗出不解。反無汗。脈尙浮者。葛朮白虎湯再解之。

或中暑大汗自出。脈虛弱。頭痛目乾。倦怠煩燥。或時惡寒。或畏日氣。無問表裏。通宜白虎湯。或裏熱甚。腹滿而脈沉可下者。宜大承氣湯。或三乙承氣湯。尤妙。傷寒表熱極甚。身疼頭疼不可忍。或眩或嘔。裏有微熱。不可發汗吐下。擬以小柴胡天水涼膈之類和解。恐不能退其熱勢之甚者。

表熱勢甚而裏已有熱。發表未開。則陽熱暴甚。故不宜汗之。表熱勢甚。若吐下之。則表之熱大乘虛而入。反成結胸等證。則危極也。

或大下後。或再三下後。熱勢尙甚而不能退。本氣損虛。而脈不能實。擬更下之。恐下脫而立死。不下之則

熱極而死。寒温諸藥不能退其熱勢之甚者。或溼熱內餘。下利不止。熱不退者。或因大下後。溼熱利不止而熱不退。脈弱氣虛不可更下者。或諸溼熱內餘。小便赤澀。大便溏泄。頻併少而急痛者。必欲作痢也。通宜黃連解毒湯以解之也。

或裏熱極甚。而恐承氣不能退者。或以下後而熱不退者。或畜熱內甚。陽厥極深。以至陽氣怫鬱。不能營運於身表四支。以致通身清（一作青）冷。痛甚不堪。項背拘急。目赤睛疼。昏眩恍惚。咽乾。或痛。躁渴虛汗。嘔吐下利。腹滿實痛。煩寃悶亂。喘急鄭聲。

鬱鬱滯不通。鄭音。聲連濁邪惡而不清雅也。此乃熱勢過極而語音濁亂。不能清利也。俗反妄傳以爲寒極陰毒。誤之甚矣。

脈須疾數。以其極熱畜甚。而脈道不利。及致脈沉細而欲絕。俗未明其造化之理。而反謂傳爲寒極陰毒者。或始得之陽熱暴甚。而便有此證候者。

夫辨傷寒陰陽之異證者。是以邪熱在表。腑病爲陽。邪熱在裏。而臟病爲陰也。俗乃妄言有寒熱陰陽之異證者。誤之久矣。且（素問傷寒直云云）熱病。誠非寒也。其三篇名曰熱論。刺熱篇。評熱病篇。及逐篇明言爲熱。竟無寒理。兼（素問及靈樞諸篇）運氣造化之理推之。則明爲熱病。誠非寒也。寒病固有。夫非汗病之謂也。且造化爲汗液之氣者。乃陽熱之氣所爲。非陰寒之所能也。以觀萬物熱極而出液。明可知矣。（經曰）夫熱病皆傷寒之類也。（又曰）人之傷於寒也。則爲熱病。然既身內有陰寒者。止爲雜病。終莫能爲汗病也。況病法曰。身熱爲熱在表。飲水爲熱在裏。其傷寒汗病本末。身涼不渴。

小便不黃脈不數者未之有也雖仲景有四逆姜附之類熱藥是以治其本裏和誤以寒藥下之太早表熱未入於裏而寒下利不止及或表熱裏寒而自利者急以四逆湯攻裏利止裏和急以解於表也故仲景四逆湯證後復有承氣下熱之說也由是觀之傷寒汗病經直言熱病而不言其有寒無疑也〔經言〕三陰證者爲邪熱在臟在裏以臟與裏爲陰也宜下熱者也夫傷寒陰陽之別者但非表熱當汗而下之則死裏熱當下而汗之亦死故仲景曰桂枝下咽陽盛卽斃承氣入胃陰實卽亡死生之要在乎須臾視身之盡不暇計日此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺短者懵然不知病源爲始乃誤使病者殞沒然則止謂邪熱在表則汗之邪熱在裏則下之熱在上則吐之熱在下則泄之邪熱半在表半在裏則和解之豈分寒熱陰陽之虛實與陰陽汗病之證邪況朱奉議自言陰毒脈疾至七至八至以上疾不可數者陰毒已深也夫旣云疾至八至已上疾不可數者正是陽熱極深之脈也豈是陰寒歟凡世俗所謂陰毒諸證以素問造化驗之皆陽熱亢極之證但畜熱極深在內而身表有似陰寒也〔經云〕亢則害承乃制言五行之道實甚過極則反似尅其已者是爲兼化如萬物熱極反出水液以火煉金熱極而反似水是以火極而似水之化也五行皆然故肝熱甚則出泪心熱甚則出汗脾熱甚則出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾今傷寒爲作汗之病氣者乃陽熱怫鬱而否極復泰卽熱氣蒸蒸而爲汗出也如天時陽熱亢旱否極而泰則復爲雨也故欲雨則天乃鬱熱晴霽則天反涼人涼則病愈熱在病在故病寒者自是寒病非此汗病之氣也雖寒屬陰水而天地陰陽氣液相生之道則寒之化不能更生陰水也〔故古聖曰〕陽中生陰陰中生陽氣中生

液。液中生氣。（又曰）積液生氣。積氣生液（又經曰）氣和而生猶液然氣爲陽物。故萬物之水液。皆生於陽熱之氣。如天氣陽熱極甚。則萬物溫潤。而冬寒萬物乾燥。由是言之。既爲作汗之病。氣本熱。非寒明矣。（故經又曰）凡傷寒而成溫病者。先夏至日爲溫病。後夏至日爲暑病。暑與其汗皆出。止言邪熱隨汗皆出盡而愈也。（又經曰）飲食飽甚。汗出於胃。驚而奪精。汗出於心。負重遠行。汗出於腎。疾走恐懼。汗出於肝。搖體勞苦。汗出於脾。此皆動亂勞苦而致陽熱以爲汗出。豈可反言作汗之病。以爲陰寒耶。今之俗醫。不明陰陽變化之道。而妄取陽主於生。陰主於死。而欲養於陽熱者。殊不知此言自生之後。以顯爲陽。陽中生陰。故生者死之道也。既死之後。以隱爲陰。陰中生陽。故死者生之道也。此古人之論道。乃死生有無動靜隱顯之陰陽。非言寒熱之陰陽也。俗又妄言（仙經云）純陽升而爲仙。純陽死而爲鬼。因以養陽熱者。亦不知此以陽主虛無而言。神爲陽。正形體而言。形爲陰。言善養生者。調順陽陰。煉就陽神。超升弃其陰體。即純陽之神。迺爲仙也。不明道者。寒熱不調。以致陰陽勝負。耗絕陽神。惟存陰殼。則遊魂冥冥。非鬼何哉。此則脩養家言形神之陰陽。而非醫家寒熱之陰陽也。俗又妄謂（周易）以陽爲尊。爲美。爲善。爲剛。爲清。爲正。而陰邪反之。因以但欲養於陽熱者。此又不知易象言。陰陽體用之道。以爲教。非言一身寒熱之陰陽也。故陽健唱命而陰順和之。陰順和之。則陰陽和平。而同歸善道。非以乾陽特爲熱也。（且夫子云）乾爲天。爲圜。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。然則乾之純陽。豈謂熱耶。此亦非特取寒冰爲陽。是取寒冰之勁健整肅清剛。爲乾健之象耳。夫寒熱之卦。坎爲中男。迺少陽之卦。即寒冰也。離中爲女。乃少陰之卦。即火熱也。坎離水火。爲夫婦。而易以陽剛

坎水寒者爲夫。而陰柔離火熱者爲婦。亦非以熱爲陽剛。而寒爲陰柔也。（故易言）陰陽者。但以明其物象。而非素問論病寒熱陰陽之氣也。（設云）乾爲寒者。本非取乾陽爲寒。但取寒之勁慄清整像乾之道也。俗又妄言人生則身温。而死則身冷。及病雖身熱。未至於死。將死者。必熱反變寒而後死也。因云陽則生。陰則死。以此專欲養於陽熱。殊不知一身之內。寒暑燥溼風火六氣渾而爲一。兩停則和平。一興一衰。病以生也。夫和平之常者。温涼得所。適當其陽和之氣。如俗云。人體温和是也。然冬寒而人腠理閟密。則身當温和。夏熱則腠理開通而多汗出。則身當微涼。相反者病。過與不及亦病。其中臟腑陰分。以爲根本。則固守陽和之氣。但當温和乃爲和平。唯臟腑之氣。各隨五行休囚旺相。死之時位而微有虛實。不一也。此之虛實。乃自然之道。而不爲病者然。冬腎水陰至而寒。復以天氣寒。則腠理閟密。而陽氣收藏。固守於內。則適當其平。而以能內外之寒。夏心火陽旺而熱。復以天氣熱。則膚腠開泄。而陽熱散越於外。適當其平。而以能內外之熱。萬物皆然。此陰陽否泰。大道造化之理。蓋莫大乎此也。然雖秋冬否閉。此以其肺腎陰王而得其所。故康彊省病。而病亦輕微也。春夏開泰。以其肝心陽壬故肢（音區）弱多病。而病熱怫鬱。則陽氣散越。故病甚而多死亡。及夫地理。方位高下。四時寒熱温涼。安危壽夭。病同。故經曰。陰精所奉人多壽。陽精所奉其人夭。（又仙經西山記）言平人四時嘗有晞。謂三焦相火無不足。八節不得吹。謂腎臟陰。難得實。然則豈可不明陰陽虛實。但欲養於陽熱耶。凡病致死者。陽和氣既不存。則止爲陰溼形體而已。非冷何哉。俗未知熱甚則熱畜於內。而陽氣不能營運於四肢身表。故四肢逆冷。以致身冷。脈細而微則死。畜熱甚者。氣血不通。而身面俱青。此則畜熱之深也。

所以仲景言傷寒熱極。失下則厥。厥深者熱亦深。而厥微者。熱亦微。如此則熱極而死者。莫不身冷脈微而以至於絕也。俗未明其然。直反妄曰。陽在則生。陽去則死。又曰。陽熱變爲陰寒則死。因以但欲養其陽熱。而反致殘陰暴絕。則陽氣後竭而死者不爲少也。俗醫未深明造化。又以妄爲傷寒得之勢惡。陽勢暴甚。而便畜熱以深。身冷厥逆。手足無復温和者。直以爲寒極而爲陰厥。以對陽厥。及表裏熱勢俱甚而不畜熱於內者。以爲陽毒以配陰毒。分爲寒熱陰陽之異證。曾不知傷寒汗病。便是熱病。實無陰毒陰厥者也。嗚呼。病本熱甚。熱蘊於裏。則陽氣陷下。以至厥逆身冷或青。而脈微。乃妄以寒極而內外急救其陽。而反招其暴害。因以妄言必死之證。間或彊實之人。素本不衰。及熱鬱怫結。況衰微者。偶中辛甘熱藥發散。而腠理氣通。怫熱以隨汗泄而愈者。遂以爲必死之病。而救之以活。反恨往之死者。救助其陽之不及。因以互相議論。但見畜熱內結厥逆者。或未厥者。早以温之。無用寒涼。恐成陰毒陰證而死。俗醫治傷寒誤人多者。無過於此。後學之士。但以素問運氣自然造化之理。原其標本。則明可見焉。且以依法救人。愼勿惑於衆人之言。〔故經曰〕謹熱陰陽無與衆謀。又曰。知逆與從。正行無問。此其道也。

或兩感勢甚者。通宜解毒加大承氣湯下之。熱不退者。宜再下之。然雖古人皆云三下之。熱未退。卽死矣。亦有按法以下四五次。利一二行。熱方退而得活者。免致不下退其熱而必死也。下後熱稍退而未愈者。黃連解毒湯調之。或微熱未除者。涼膈散調之。或失下熱極以致身冷脈微而昏冒將死者。急下之。則殘陰暴絕而死。蓋陽氣後竭而然也。不下亦死。宜涼膈散。或黃連解毒湯。養陰退陽。畜熱漸以宣散。則心胸

復暖。脈漸以生。至於脈復而有力。方可以三一承氣湯下之。或解毒加大承氣湯。尤良。後下後微熱不解。涼膈散調之。愈後常宜服愈熱之藥。忌發熱諸物。

傷寒表證

夫傷寒之候。頭項痛。腰脊彊。身體拘急。表熱惡寒。不煩燥。無自汗。或頭面目痛。肌熱。鼻乾。或胸滿而喘。手足指末微厥。脈浮數而緊者。邪熱在表。皆麻黃湯發汗之證也。或天水散之類甚佳。無使藥不中效而益加害也。

益元散一名天水散。一名太白散。

治身熱。嘔吐。泄瀉。腸澼。下痢赤白。治淋閉癃閟。疼痛。利小腑。偏主石淋。蕩胸中積聚寒熱。大益精氣。通九竅六腑津液。去留結消。畜水止渴。利中除煩熱。心燥。治腹脹痛悶。補益五臟。大養脾腎之氣。此腎水之臟。非胃土之腑也。理內傷陰痿。安魂定魄。補五勞七傷。一切虛損。主癲癡驚悸。健忘。止煩滿。短氣。臟傷咳嗽。療飲食不下。肌肉疼痛。治口瘡。牙齒疳蝕。明耳目。壯筋骨。通經脈。和氣血。消水穀。保眞元。解百藥酒食邪熱毒。耐勞役。饑渴寒熱。辟中外諸邪所傷。久服強志輕身。注顏益壽。及解中暑傷寒。疫癘。饑飽勞損。憂愁思慮。恚怒驚恐。傳染幷汗後遺熱。勞復諸疾。兼解兩感傷寒。能遍身結滯宣通。和氣而愈。及婦人下乳催生。幷產後損液。血虛陰虛。熱甚一切諸證。並宜服之。兼愚吹乳。乳發。或已覺吹乳。乳癰。頻服即愈。迺神驗之仙藥也。

石淋服金石熱藥結爲砂石。自小便中出。痛不可忍。

傷風表證　一曰中風。

夫傷風之候。頭痛項強。股節煩疼。或目疼肌熱。乾嘔鼻鳴。手足温。自汗出。惡風寒。脈陽浮而緩。陰浮而弱也。關前曰陽。關後曰陰。此爲邪熱在表。皆桂枝湯解肌之證也。或汗出憎風。而加項背強痛者。宜桂枝湯加葛根湯也。反無汗者。宜葛根湯也。雖已服桂枝。反煩不解而無裏證者。先刺風池風府。却與服之。或服桂枝大汗出。脈浮而洪大。再宜服之。發汗後半日許。復熱煩。脈浮數者。再宜桂枝湯也。當汗而反下之。不成結胸。而但下利。清穀不化。表證尚在者。表熱裏寒也。

此言承氣寒藥下之者也。或誤用巴豆熱藥下之。而脅熱利不止者。或表裏皆熱自利。或嘔者。皆宜五苓散。止利兼解表也。

急以四逆湯温裏。利止裏和。急以桂枝湯解表。

或表熱裏和。下利同法。

或陽明病脈浮遲。汗出微怒寒。或太陰病腹滿而脈浮。或宜汗入下之。但氣上衝而脈浮者。並宜桂枝湯也。

脈反沉實者。大承氣湯下之。

或下之早而心下痞。汗出惡寒。脈浮者。表未解也。先桂枝以解表。而後以大黄黄連瀉心湯以攻其痞也。

太陽病不解而畜血下焦者。見畜血門。先桂枝解表已。而以下血也。

宜桃仁承氣湯。或抵當圓攻之。

俱中風寒

頭項痛。肢體疼。手足温。爲中風也。反無汗惡寒。脈浮緊者。爲陰寒也。或頭項痛腰脊強。身體拘急。指末微厥不自汗。爲傷寒也。反煩燥而脈緩者。爲傷風也。風則傷衞而寒則傷榮。

萬物必以陰求陽。陽求陰。陰陽相應。則爲和平。故榮者。陰氣也。寒加之則傷耳。故又曰。寒傷血。血亦陰也。衞陽氣也。風亦陽也。故風加之。則傷耳。故曰熱傷氣。氣爲陽也。經言陰寒主於閉藏。而陽熱主於開泄。故寒傷榮則腠理閉密。怫熱內作。燥熱而無汗。故脈數浮而緊也。風傷衞。則腠理開泄而自汗也。故脈浮而緩。以邪熱泄越。故脈不能實。陽明主於肌肉。故自汗多而脈反遲也。熱乃陽中之至陽。故傷熱氣。則大汗自出。病雖爲熱。脈不能實而虛弱也。然怫熱痞閉無汗者。故當病也。其汗泄通泰而亦病者。蓋泰極則否也。夫人氣和而爲汗。如天地氣和而爲雨。過多則澇。久不雨則旱。有無多少。貴乎應時。與衰失常。則災害至矣。萬事皆然。

榮衞俱傷。則表裏熱甚也。宜大青龍湯。

小青龍湯治傷寒表未罷。心下有水氣。

表雖未罷。而已有熱入於裏。怫鬱於胃。則飲食水液不能傳化宣行。畜積不散而爲此。非裏熱大實煩渴引飲過多停積而爲病者。

乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。

水不浸潤。宣散滋潤腸胃臟腑。故熱而渴。或噎。或喘。或小腑不利。少腹滿而喘也。水液不能宣行。則溼

熱甚於腸胃故或利也

小柴胡湯治傷寒中風其病半在表半在裏。脈在肌肉不沉不浮・筋脈拘急。身體疼痛寒熱往來。惡寒爲表熱・發熱爲裏熱・寒熱往來者邪熱半在表半在裏也。進退不已而言無常也。或嘔或欬胸脅痞滿硬痛下之前後無問日數及汗後餘熱不解或無問傷寒雜病蒸熱作發并兩感可和解者並宜服之

涼膈散一名連翹飲子治傷寒表不解半入於裏下證未全或復未愈者或燥熱怫結於內而煩心懊憹不得眠者反無問傷寒雜病大人小兒臟腑積熱煩燥多渴面熱頭昏唇焦咽燥舌腫喉痺目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡痰實不利欬唾稠粘睡臥不安譫語狂妄腸胃溼燥便尿悶結一切風熱壅滯風眩瘡癬及傷寒陽明胃熱發斑下證未全者或誤服煖藥過多爲諸熱證并酒甚熱毒兼小兒癍瘺痘瘡未出及驚風積熱傷寒不能辨別者或熱甚痘瘡已出未快者或熱極黑陷將死者

小兒疹痘未出誤以熱藥發汗致使陽熱轉甚則重密出不快多致黑陷而死因以世俗多癍疹不敢服藥以誤小兒諸病多矣亦不知古人所留涼瀉之藥通治風驚積熱傷寒熱病縱誤是癍瘡亦使熱勢稍退而稀少出快早得痊安也若用此最爲妙也

閻孝忠集小兒方論未達錢氏本意不明造化之理反妄言疹病黑陷爲寒及曰凡癍疹始終不可服涼瀉之藥後人因之反致熱甚黑陷而死者不可勝計也閻公豈不詳自所編錢氏方治癍疹黑陷用

牛李膏及百祥圓。凡寒藥下之而多得痊愈者。而不救則必死。然則痘疹之爲熱病。豈不明哉。況經曰。諸痛痒瘡瘍。皆屬於心。及夫癍瘡黑陷無不腹滿喘喝斷聲而小便赤澀不通。豈不是熱極乎。況癍疹本因熱而生。病勢轉甚也。豈能反爲寒者也。

並兩感諸證。三陰三陽雙傳諸證。並宜服之。或傷寒熱極將死。陰氣衰殘。則不宜下。下之則陰氣暴絕。陽氣後竭而死矣。惟宜養陰退陽。以至脈復而有力。而後以三乙承氣湯微下之。下後未愈者。更以涼膈散調之。雖愈後猶宜少少服之。庶邪熱不致再作也。

白虎湯。治傷風自汗。桂枝證表未解。半入裏。可以和解者。

脈在肌肉而不可下者也。

或中暑自汗。脈虛弱者。

熱傷氣而反自汗大出。故脈不能自實。而反虛弱。

或傷寒自汗。脈滑數而實。表裏俱熱。

脈沉浮皆得有力而數。身熱頭痛煩渴腹滿。小便赤黃也。

或三陽合病。言太陽少陽陽明合受其爲病之熱氣。腹滿身重。難以轉側。口燥面垢。譫語遺尿。如誤發汗。則譫言益甚。下之則便額上出汗。後必發黃。

或厥逆自汗者。是謂熱越。言自汗散越也。如或裏熱而脈厥者。或下證未全者。兼和解兩感傷寒。此方最解頭痛。并止自汗。無問中暑傷寒風熱雜病。及傳染時疫。本非外傷風寒。脈便不浮而自汗。頭痛。欲作汗

病者、並宜服之。

無問四時。但隨證詳而用之。他藥倣此。

五苓散　治中暑幷傷寒大發汗後。胃中乾。煩燥不得眠。脈浮。小便不利。後熱煩渴。及表裏俱熱。飲水反吐。名曰水逆。或攻痞不解。或口乾煩渴。小便不利。或痞尙在而利不止者。或當汗而反下之。利遂不止。脈浮表不解。自利。或小便不利者。

凡用五苓散證。無問脈之沉浮。

或一切留飲不散。以此散水止渴。幷解兩感太陽少陽俱病。

〔經言〕六經病證者是也。

或一切吐瀉霍亂。無問寒熱。及小兒瀉。驚風。無問急慢。皆宜服之。

桂苓甘露散。一名桂苓白朮散　治傷寒中風。冒暑。飲食。內外一切所傷。傳受溼熱內甚。或頭痛口乾。或吐瀉煩渴。或小便赤澁。大便急痛。或瀉痢間作。幷一切溼熱。霍亂。吐瀉轉筋。急痛腹滿痛悶。或中外諸邪所傷。而幷吐瀉者。溼熱之時尤宜服之。

幷治小兒驚風。

白朮散　治傷寒雜病。一切吐瀉煩渴。霍亂虛損。及氣弱久虛。保衰老。兼酒膈嘔噦。

四逆湯　治傷寒表熱未入於裏。誤以寒藥下之。太早。其表熱本未入而因裏寒下利不止。或表熱裏寒自利不止者。急以四逆溫裏。

脈浮不渴。小便清白。不温。完谷不化者是也。或辨便溺之色者。須更審其飲食萬物之色也。或下後協熱利不止者。咽乾煩渴也。謹不宜温也。宜五苓之類散其溼熱也。惟裏寒者。可以温之。止其寒瀉。利止裏和。表證尚在者。急以桂枝湯解表也。或雜病寒飲嘔吐者。或寒溼泄瀉者。然雖雜病。若溼熱吐瀉者。不宜此方。雖亦有溼熱痞閉之微者。誤中辛熱開發而効。甚者強刼不開。則怫熱病轉加也。惟裏寒可通用四逆湯也。

茯苓半夏湯　治傷寒雜病。一切嘔吐。或喘欬頭痛者。

半夏茯苓湯　治傷寒雜病。嘔噦。風眩疾逆。欬喘頭痛。幷風熱反胃。吐食諸證。

黄連解毒湯　治傷寒雜病。幷酒燥熱毒。煩悶乾嘔。口燥呻吟。錯語。不得眠。凡一切大熱狂燥。喘滿。及陽厥極甚。畜熱内深。俗妄傳爲陰毒者。見前勢。表熱太甚。頭項支體痛不可忍。脈洪躁。裏有微熱。不可汗者。或溼熱内甚。或欲作痢者。

大便溏數而少。急痛小便赤。或澀者。必欲作痢也。

或已利。熱勢甚者。幷服本方。及下之前後寒涼諸藥不能退其熱勢之甚者。兩感諸證同法。

兩感者。一日太陽與太陰俱病。則頭痛口乾而煩滿。二日陽明與太陰俱病。則耳聾囊縮而厥。通宜此方以退表裏諸熱。朱氏不明此皆熱證。妄言前三日眞爲病寒。以四逆湯急温裏。而後以桂枝湯急解表。大誤人也。此二方皆不可用。但隨表與裏熱勢微甚。以退其熱。使無致熱極而死者是也。若勢甚宜下者。加大承氣湯下之。及夫經言此三日傳受。亦大略之法也。大抵宜隨證以施治。亦不必拘也。

或勢甚欲下。慮不能退其熱者。加大承氣湯下之。或熱結極深。而諸藥數下。畢竟不能利。不救必死者。此法更下甘遂末一錢以下之。吐利同效或但自熱結胸中。心胸高起。腹雖不滿。而但喘急悶結。譫妄昏冒。關脈沈數而緊者。尤宜此法急以下。

吐愈佳

瓜蒂散　治表證罷。邪熱入裏。結於胸中。煩滿而飢不能食。微厥而脈乍緊者。宜以吐之。

諸可下證

大柴胡湯　諸服小柴胡湯證後病不解。表裏熱勢更甚。而心下急鬱微煩。或發熱汗出不解。下心痞鞕。嘔吐下利。已上屬太陽・或陽明病多汗。或少陰病下利清水。心下痛而口乾。或太陰病腹滿而痛。或無表裏證。但發熱七八日。雖脈浮而數。或脈在肌肉。實數而滑者。及兩感諸證。可微下者。雙除表裏之熱者。並宜此劑。

大承氣湯　治大小二柴胡證後。表裏俱熱。病勢更甚者。或陽明脈遲。汗出不惡寒。陽明主肌肉。熱甚自汗多。故脈不能數而反遲也。裏熱更甚。故不惡寒而反微熱也。身重短氣。腹滿而喘。有時潮熱。

惡寒爲表熱。當汗而不可下。發熱爲裏熱。當下而不可汗。

或手足心濈然汗出者。濈・阻立切・和也・

今言唯手心足心氣似和然而汗出也。

此大便已鞕也。或吐下後不解。不大便五六日至十餘日。日晡潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。刺者發則不識人。循衣摸床。惕然而安。微喘。此陽明裏熱極甚也。

足陽明胃經。外肌肉爲十二經之長。內爲五臟之本六腑之大源。故陽明胃病。雖爲腑病。其脈沉數而實者。皆當下之也。然腸胃熱甚。則大黃自黃赤變褐以至於黑者難治也。凡潮熱譫語。不能食者。腸中已有燥糞。能食者。但鞕耳。舊云。胸中有燥糞。是寄手陽明證。在足陽明也。燥糞實非在於胸耳。

或陽明病下之後。心胸燥熱而懊憹煩燥者。亡液故也。或煩熱汗出則解。復如瘧狀。日晡發熱。而脈沈實者。宜以下也。

脈浮虛者桂枝湯主之

或六七日不大便。目不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。或小便不利。大便乍難乍易。時發微熱。喘。胃不能臥者。有燥糞也。或三部脈皆平。心下鞕。或脈大而緊者。或下利脈滑而數者。或下利脈遲而滑者。遲由熱泄不止而致之。實非寒也。

或少陽病二三日。口燥咽乾者。或自利清水。色純青。心下痞痛。口燥者。皆溼熱相搏於腸胃之內。而成下利也。然熱則鬱結。濕則痞閉。故水液不結。

浸潤於外。則腸胃之外燥熱太甚。而煩渴不止。腸胸之內溼熱瀉也。本因熱鬱而留飲以成溼也。

或諸腹滿實痛。煩渴譫妄。脈實數而沉者。無問日數。並宜大承氣下之。或裏熱燥甚。腸胸怫鬱。留飲不散。煩渴止。胸腹高起。痛不可忍。但嘔冷液。大渴。反不能飲。飲亦不能止其渴。喘急悶亂。但欲死者。熱服下咽

立止其渴。有若無病之人。須臾大汗而愈。至此往往多未利而汗出。亦有藥力但隨汗之宣通。則不利而愈者也。

小承氣湯　治傷寒日深。恐有燥屎。欲知之法。少服小承氣湯。腹中轉失氣。（謂動轉失泄之氣也。）有燥屎也。乃可攻之。不轉失氣者。必初鞕後溏。未可攻之。攻之則腹滿不能食也。欲飲水而嚥。其後發熱者。大便復鞕而少也。宜小承氣和之。若腹大滿不通。與小承氣湯微和胸氣。勿大洩也。或陽明多汗。津液外出。腸胃燥熱。大便必鞕而譫語也。或譫語脈滑疾。或發汗吐下後。微煩。小便數。大便因鞕者。或下利譫語者。多復有燥屎也。通宜小承氣湯下之。或得病二三日。脈弱無太陽陽柴胡證。煩心心下鞕。至四五日。雖然食少。少與小承氣湯和之。令小安。

調胃承氣湯　治諸發汗。和解吐後不惡寒。但發熱。而或蒸蒸然者。或日深。心下溫溫欲吐。而胸中滿痛。大便及溏。腹微滿。鬱鬱微煩。先此時自極吐下者。（先。蘇佃切。）

先此時者。先於此時之前。已曾自極吐下。而復此證也。

或日深裏熱譫語。法當承氣下之。誤以銀粉巴豆燥熱大毒丸藥下之。以致眞陰損虛。則邪熱轉甚。（甚者。爲邪。衰者爲正。）因而協熱下利不止。脈反調和也。（協。胡劫切。和也。合也。）

今言病本爲熱。而又與辛熱大毒圓藥下之。則兩熱協和相合而熱甚。下利不止也。下利脈當微厥。而其熱藥攻之。故脈反適當其調和也。言有熱利不止而脈反平。或滑實大而緊者也。

反或表裏裏和而下之太早。表熱乘虛入裏。而或不成結胸。但爲熱利不止。心下滿鞕成痛。煩渴咽乾。脈

滑數而或實者。或諸腹滿實痛者。或煩渴譫妄者。小便赤澀。大便或鞕。或熱泄脈滑實而緊甚也。並宜調胃承氣湯下之。

三一承氣湯　通治大小調胃三承氣湯證。

大法表證罷。熱傳於裏。則宜下之。熱除卽愈。宜調胃承氣也。此失下熱極則危而死矣。表病裏和。則當汗之。熱泄身涼卽愈。若反下之。則表熱乘虛入裏而成結胸之類諸病也。或表熱半傳於裏。半尙在表。則不可汗下。宜小柴胡之類和解之也。或表裏兩證。熱勢俱甚。而和解不能已者。雖邪熱半在裏。半在表。法當寒熱往來。以其表裏熱勢俱甚。故亦不惡寒而俱惡熱也。宜柴胡湯微下之。通除表裏之熱也。或誤用調胃承氣。則止能攻裏。不能除其表熱。或用小承氣多攻裏。少除表。則表熱乘虛入裏。皆能爲害也。其大柴胡證勢更甚者。宜大承氣下之。設未全愈而或有表之微淺邪熱入之於裏。以其厚朴枳實之類。善開結滯而不能成其結胸之類諸病也。故活人書言。攻裏之藥調胃承氣最緊。小承氣次之。大承氣又次之。大柴胡最爲緩慢。故表證未罷而爲裏熱已甚。須可緩下者。先大柴胡。次大承氣。亦可通也。若善論開鬱結怫熱峻疾得利而效。至大設未痊除。而亦難再鬱結者。大承氣也。故活人書復言。大承氣最緊。小承氣次之。調胃承氣又次之。大柴胡最慢也。是以可急下之者。宜大承氣也。故雖大柴亦可通用。而復無急下之證也。或可微下。及微和胃氣者。小承氣湯調胃承氣爲後先之次。由是觀之。而緩下急下。善開發而難鬱結可通用者。大承氣湯最爲妙也。故今加甘草名曰三一承氣湯。通治三承氣湯於效甚速而無加害也。然以其甘草味能緩其急結。溫射潤燥而又善以和合諸藥。而能成功。

故本草云國老子也是以大承氣湯得其甘草則尤妙也然此一方是三承氣湯合而爲一也善能隨證消息但有此方不須復用大小調胃承氣等湯也

或無問傷寒雜病內外一切所傷日數遠近但以腹滿咽乾煩渴譫妄心下按之鞕痛或但腹滿實痛或小便赤澁大便結滯或溼熱內甚而爲滑泄或熱甚喘咳悶亂驚悸癲狂目疾口瘡舌腫喉痺癰腫瘡瘍或傷寒陽明胸熱發斑脈沉須可下者及小兒驚風熱極潮搐涎喘昏塞幷斑疹痘瘡熱極黑陷小便不通腹滿喘急將欲死者或斑疹後熱毒不退久不作痂者痂音茄瘡痂也或作斑癰瘡癬久不已者或怫熱內成炫癖堅積腹滿而喘黃瘦潮熱驚風熱積及大人小兒久新瘧疾暴卒心痛風痰酒膈腸垢積滯久壅風暴傷酒食煩心悶亂脈數沉實或腎水陰虛陽熱暴甚而僵仆卒中或一切暴瘖不語失音或畜熱內甚陽厥極深脈反沈細而欲絕者或表之冲和正氣與邪氣幷之於裏則裏熱亢甚而陽極似陰反爲寒戰脈微而絕者或風熱燥甚客於下焦而大小便澁滯或不通者

風木能勝溼土火熱能耗水液因而成燥燥則緊斂堅結滯不通故風熱燥甚於下焦則燥糞結硬腹又緊斂者其燥糞不能相離幷膀胱燥鬱不能滲泄故不通也愼不可用銀粉巴豆大毒燥熱圓藥下之反生燥熱而耗其陰液也故傷寒下熱古皆禁之最宜三乙承氣湯兼用下取法

或產婦胎死不下者

風熱燥溼緊斂則產戶不得自然開通也其證逆脈弦數而濇面赤或青或變五色腹滿急痛喘鬧胎已不動者是也手足温而脈滑者止爲難產但宜滑胎催生愼不可下也

及兩感表裏熱甚。欲可下者。並宜三乙承氣　大承氣加甘草是也。或下食積及急攻結滯者。調下輕粉一字。滯下目疾口瘡咽喉瘡瘍斑疹加涼膈散下死胎加益元散。

十棗湯　治太陽中風下痢嘔逆。表證罷。乾嘔短氣。不惡寒。漐漐汗出。發作有時。頭痛。心下痞鞕滿。引下痛者。兼下水腫腹脹。幷酒積食積一切腸垢積滯。痃癖堅積。或畜熱心腹暴痛。或瘧氣久不已者。或表之正氣與邪熱幷甚於裏。熱極似陰而反寒戰。表氣入裏而陽厥極深。故脈微而欲絕也。幷風熱燥甚結於下焦。大便不通。或實熱腰痛者。及小兒熱結乳癖。積熱作發。驚風潮搐。斑疹熱毒。不能了絕者。宜以下之。

瘀血下證瘀・於預切・積也・又音於・

桃仁承氣湯　治太陽病不解。而循經熱結在膀胱。其人如狂。血自下者愈。表不解者。先以桂枝湯解表已。而但小腹急結者。乃以下之　或言少腹者誤也。臍上爲腹。腹下爲小腹。小腹兩旁謂之少腹。凡下皆作小腹也。

抵當圓　治傷寒裏熱少。腸滿。當小便不利。今反利者。有畜血也。宜以下之。

抵當湯　治太陽日深。表證仍在。循經而熱。畜下焦。脈微而沈。不結胸而發狂者。熱在下焦少腹。當鞕滿。小便自利也。血下乃愈。宜以攻之。或太陽病身黃脈沈者。循經而畜熱下焦也。少腹鞕。小便不利。爲無血。小便自利如狂者。瘀血證也。或陽明畜熱內甚。而喜忘・喜・許記切・或狂。大便雖鞕而反易。不難也。其色黑者。有畜血也。或無表裏證。但發熱日深。脈雖浮者。亦可下之。或已下後。脈數胸熱。消穀善饑。數日不大便者。有瘀血也。並宜抵當湯下之。

發黃

茵蔯湯　治陽明裏熱極甚。煩渴熱鬱。留飲不散。以致溼熱相搏。而身體發黃。或言寒熱相搏。而發黃者誤也。則如萬物溼熱甚。則自生黃色。答或也本傷寒熱極失下。或誤汗之。溫之。灸之。熨之。或誤服銀粉巴豆大毒熱藥下之。反以亡液損其陰氣。邪熱轉甚。或下之太早。熱入裏。不成結胸。但以發黃者。或失寒涼調治。或熱勢本惡。雖按法之而不能退。其熱勢之甚者。或下後熱勢不退。皆能發於黃也。大抵本因熱鬱極甚。留飲不散。溼熱相搏而黃也。

其候但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利。渴飲水漿者。身必發黃也。

佛熱在表。燥而無汗。溼熱在裏。氣甚不能散越於外。則溼熱之氣鬱甚。而上行以至頭面。陽極之分。則溼熱蒸爲微汗。而頸下無汗。然溼熱不能自然宣通散越於周身。故溼熱鬱之極甚。而面目遍身發黃色也。故白虎湯證。遍身自汗出者。仲景謂之散越。不發於黃也。小便不利者。溼熱發黃之證也。或小便自利。或狂。或大便黑者。瘀血證也。發黃亦有譫妄者。本所不言。以黃證未明。故不須言也。

宜茵蔯湯調下五苓散。以利小便。退其溼熱也。以黃者。茵蔯湯利大小便也。

結胸

汗下之後。不大便五六日。舌乾而渴。日晡小有潮熱。從心至少腹鞕滿而痛不可近。脈尙沈緊滑數。或但關脈沈緊者。通宜大陷胸湯。或丸下之。或脈浮者表未罷也。不可下之。下之死。宜小陷胸湯。及小柴胡之類和解。未罷者。方可下之。或結胸雖脈浮而裏熱勢惡。須可下者。宜三乙承氣湯一服。分作三次。約三時

許。服訖得利甚良。雖未利稍減。脈必漸沉。病微者。止用三一承氣湯半服。按而下之。裏熱甚者。以大陷胸湯大半服而下之。

謂有前藥之力也。然須二方中甘遂反甘草。或勢惡者。故意以甘草擊甘遂。使開發峻疾而爲效速矣。故世方及活人書。雙圓子亦直用甘草甘遂也。

或但結胸。別無大段熱證。但頭微汗出。脈沉潛者。水結胸也。通宜大陷胸湯。小結胸者。心下按之而痛。脈浮而滑。別無大段熱證也。

此亦下之早而熱結心胸也。但以熱微於大結胸。而甚於痞。但熱之微甚也。俗未明之。又以妄謂但結胸無大熱證。爲寒實結胸。殊不知素問明言熱病。而實非寒也。及夫臟結。陰結。陽結者。經以熱結於腑。而腑爲陽。是名陽結。熱結於臟。而臟爲陰。是名陰結。一名臟結也。然熱結於腑則微而淺。故病厥微而易治。熱結於臟則深。而當病甚故厥深而難治矣。或臟結畜熱極深而至身冷脈微而欲絕者。表之熱證反不見也。俗未知本熱極而致反言陰寒臟結。本亦病熱極。俗又妄加熱藥。反絕殘陰而暴死。十無一生。因以世傳臟結便爲死病也。若以素問六氣脈證標本驗之。則明可見其熱證也。留飲不散而成頭汗而脈沉潛。反附於骨者。積飲以成水結胸。及水結胸者。通宜小陷胸湯也。

痞

傷寒表裏俱熱。下證未全。法當和解。誤下之早。則成痞。心下痞滿而不痛。按之軟虛也。

然須裏之陰分已受熱入而爲病。是謂病發於陰也。或熱微。下證未全。則不任轉瀉。誤下之早。則裏之微熱除去之外。反爲熱入所損。虛而表熱。故虛入裏。雖不能成結胸。亦作痞也。俗醫妄謂陰寒之作發。下之早而成痞者誤也。然病既已爲陰寒。何得更言發於陰也。寒病畢竟不可下。何得言其下之早也。既言其早。則病熱發於陰也。故此之邪熱病之表於陽分。而裏和未有邪熱。反以下之太早。則裏乃極虛。而表之全熱大入於裏。此失之至大。故成結胸。而病熱勢惡也。痞則誤之小。故爲熱勢輕微也。小結胸者。微於大結胸。而甚於痞也。但分誤之大小。熱之微甚。非謂痞爲寒也。故仲景本攻痞多用大黃黃連黃芩寒藥耳。後或以加附子乾姜之類者。是以辛熱佐其寒藥。欲令開發痞之怫熱結滯也。非攻寒耳。故攻痞不開者。後當陷胸湯寒藥下其熱也。或當用大柴胡大承氣雙下表裏。而無使表熱入裏。以成結胸及痞。若誤用調胃承氣。但攻其裏。則表熱入裏而亦成痞也。或無問可下不可下。而誤用銀粉巴豆燥熱大毒圓藥下之。反以損陰亡液。以使怫熱太甚。亦或成痞。或爲諸熱變證。各以本論詳之。

痞脈浮而尙惡寒者。表未解也。當先桂枝湯解表已。而後攻痞也。或只服五苓散。便雙散表裏甚良。或痞惡寒而汗出者。或痞而煩渴小便不利者。或痞而留飮溼熱下痢者。或已成痞而因藥利尙不止。以其痞滿。誤更下之。其痞轉甚。嘔噦下利。心煩燥者。無問痞脈沉浮。並宜煎生姜湯。生姜湯一味。調下五苓散。每服四五錢。頻服或痞不已。則後亦實熱煩滿。或譫妄脈沉無他證者。宜大黃黃連瀉心湯。或用前方小陷胸亦得。

懊憹

懊憹者。煩心熱燥。悶亂不寧也。甚者似中巴豆草烏頭之類毒藥之狀也。

梔子湯　治懊憹煩心。反復顛倒。不得眠者。燥熱怫鬱於內。而氣不能宣通也。

經曰。血氣者。人之神。由榮衞血氣運行。則神在乎其中也。然神行於表。則榮衞流注於經。謂之行陽。令人寤。猶天之日出爲晝也。神行於裏。則五臟相生而順傳。謂之行陰。令人寐。故神識外無所用。而惑神迷於內。則復爲夢也。猶日入於夜。其夫燥金主澁。而溼土主滑。夫燥溼之體。必先因之於彼氣。而後爲其兼化也。猶先大涼而物後燥。及風勝溼熱耗其液。而成燥體。及熱太甚。則萬物溼潤而出液者也。由是表熱無燥者。氣血運行通利。而成癲狂走呼而力大者也。燥熱病於外者。氣血壅滯。則痿弱而無力也。故病內熱而無燥者。津液潤澤。氣血滑利。則昏冒多睡也。如洗心散寒藥言治多睡是也。故小兒盡精健。夜安寢。由血液不衰也。夫燥熱病於內者。氣血澁滯。則懊憹煩心不得眠也。夫傷寒之燥熱者。因於大發吐下。或嘔吐瀉痢。自汗過多。或陽熱太甚。損陰耗液。亡液則血衰而成燥熱也。或灸熨灸烙。或誤服熱劑。或誤因銀粉巴豆燥熱大毒圓藥下之。反損陰亡液。血衰則燥熱太甚。多爲此誤。（經曰）目得血而能視。耳得血而能聽。手指得血而能操。掌得血而能握。足得血而能步。臟得血而能液。腑得血而能氣。然則一身之至貴者。莫過於血。故陽熱雖甚。而血液不衰。則榮衞通利。而爲病微。血液既衰。以成燥熱怫鬱。則病甚也。且如酒熱方甚。而血液未衰。則氣血宣通而和暢。因其酒熱損陰亡液。以致血衰而酒漸以散之。燥熱怫鬱而煩渴病於酒也。而再飲後得平者。氣液宣行。而燥熱怫鬱後得散也。或不受復者。酒毒已甚。燥熱不能散也。亦猶世俗妄意以分陽毒。微於陰毒者。是謂內外燥熱太甚。而血液不衰。則血氣運行之太甚而爲病

者。猶泰極失常。以爲陽毒也。以血液衰竭燥熱太甚。畜之於內。則陽氣不能營運於表。故徧身清冷。厥逆病危極將死者。妄謂寒極陰毒也。因以中外急救其陽。而反招暴禍。倘或病熱尙微。而誤中素問言辛熱開發強劫之效。因以妄矜己能。以謂陰毒必死之證。救之以活。致使世俗愈惑而惟恨救之不及。誤人多矣。殊不知但以退熱潤燥散結。則氣液宣行而愈也。故經曰。腎苦燥。急食辛以溫之。開腠理。致津液。通氣脈也。然氣通和。卽津液宣行也。（故經曰）氣和而生津液。相盛而神自生。

或胸滿結滯。或頭微汗出處煩者。梔子湯主之。或少氣者。加甘草一錢。或加嘔者。及初誤以圓藥下之者。加生姜半兩。凡懊憹虛煩者。皆用涼膈散甚佳。及宜湯濯手足。使心胸結熱宣散而已。

梔子厚朴湯　治心煩腹滿。坐臥不安。

傷寒直格論卷下

習醫要用直格

諸證藥石分劑

麻黃散

麻黃一兩半・去節・湯泡去黃汁・焙乾秤・桂枝一兩・削去皴皮・官桂是也・

甘草半兩炙　杏仁二十粒・湯浸去皮尖・雙仁者下・並同法・

右剉如麻豆大每服五錢匕・匕・匙也・謂錢作匙抄也・水一盞半煎至八分濾去滓温服滓・阻史切・澱也・粕也・衣覆以取微汗　或温病身煩痛小便自利者加白朮四分微汗之每一分・二錢半也・

益元散一名天水散・一名太白散・

滑石六兩・白膩好者・甘草一兩

右爲細末每服三錢蜜少許温水調下或無蜜亦可每時日三服或欲冷飲者新井泉調下亦得解利發汗煎葱白豆豉湯下每服水一盞葱白五寸豆豉五十粒煮取汁七分調併三四服以效爲度此藥是寒涼解散熱鬱設病甚不解多服無害但有益耳本世傳名太白散俗惡性寒忽易得之賤物而又不明素問造化之理故不取本草神驗之言而多不用焉若以隨證驗之乃凡人之仙藥也何可缺歟

夫傷寒當汗則不可下當下則不可汗且如誤服此藥則汗自不出而裏熱亦獲不效亦有裏熱便

得宣通而愈者也。或半在表。半在裏。可和解而不可吐下發汗者。若服此藥多愈。或不愈。亦小減加涼膈散和解尤佳　或自當汗解者。更加蒼朮粗末三錢。同葱豉煎湯調服尤良。或孕婦不宜滑石。麻黃桂枝輩發汗。卽用甘草一兩。蒼朮二兩。同爲粗末。每服四錢。水一盞。葱白五寸。豉五十粒。同煎至六分。濾去滓。熱服。併二三服。取微汗。是名逼毒散。非孕婦亦可服。或大白散加麻黃二兩去節。如法煎服。世云神白散。　或逼毒散。加麻黃與蒼朮等分去節。濟衆云。靑龍散。　或靑龍散更加滑石末與蒼朮二倍。是爲發汗之妙藥。名曰大逼毒散。此方唯正可汗者。卽用誤服之。則轉加熱也。或解利兩感。煎涼膈調下益元散四錢。　或下乳用猪肉麵羹粥飮湯之類。調下四錢。不拘時候。日三服。及宜食肉麵羹粥。催產溫香油漿調下五錢。併二三服。以產爲度　或死胎不下者。煎三乙承氣湯一服。調下益元散五錢。須臾更頻用油漿調益元散溫服。前後俱下。而胎下可活產母也。凡難產或死胎不下。皆由風熱燥澁緊斂結滯。而不能舒緩。故產戶不得自然開逼也。此藥力至則結滯頓開而產矣。後愼不可溫補。而反生燥熱也。俗未知產後亡液損血。疼痛怖懼。以致神狂氣亂。則陰氣損虛。邪熱太甚而爲諸熱證。由不讀素問。不知造化。故不識證候陰陽。反以妄爲產諸虛百損。便爲虛冷而無熱也。誤以熱藥溫補。或見煩渴者。不令飮水。本雖善心。爲害多矣。豈治病之道。但以臨時審其臟腑六氣虛實。明其標本。如法治之而已矣。此藥泛常多用。然須爲效至大。而俗以病異藥同。將謂妄行。反招侮慢。今以黃丹加令桃紅色。名曰紅玉散。　加靑黛令輕碧色。名碧玉散。　加薄荷葉一分。名雞蘇散。主療不殊。收效則一。俗目懵然。何能別此。可遠妄侮。可顯玄功。後之學者。其究心焉。

桂枝湯

桂枝去皮　芍藥　甘草炙等分三分爲率

右剉如麻黃大每服八錢水一盞半姜三片棗三枚擘破煎至七分令去滓温服續後啜熱稀粥温覆令遍身微汗或暖也及初夏可加黃芩一兩名陽旦湯大熱之分及素有熱人可再加知母半兩石膏一兩爲末或更加升麻一分禁生冷黏滑肉麵五辛酒酪息物等桂枝證反下之不成結胸及痞但腰滿證在者本方倍加芍藥大實痛者更加大黃半兩脈弱自利者不加

桂枝加葛枝湯

桂枝　芍藥　甘草各六錢三字　葛枝一兩三錢

右如桂枝湯服謂如桂枝湯剉煎服也下並倣此

葛枝湯

葛根一兩　麻黃泡去黃汁焙乾秤三分　桂枝去皮　芍藥　甘草炙各半兩

右如桂枝湯服

大青龍湯

麻黃如前製石膏爲末各三分桂枝一分半　甘草炙一分　杏仁十枚湯去皮尖雙仁

右剉如麻豆大。抄五錢。水一盞。生姜三片。棗三枚。擘破。煎至半盞。濾去滓。温服。令身汗溼。未潤再服。

小青龍湯

麻黃 如前製　半夏 湯洗芍藥　細辛　乾姜　甘草炙　桂枝去皴各三分　五味子二錢

右剉麻豆大。每服八錢。水一盞半。生姜四片。煎至七分。絞汁温服。○渴者。去半夏。加栝蔞根三錢。○微利。去麻黃。加芫花彈子大。○噎者。去麻黃。加附子二錢。炮以開佛熱結滯。○小便不利。少腹滿者。去麻黃。加茯苓四錢。○喘者。去麻黃。加杏仁。製如前法此方燥至温散其水。以潤腸胃臟腑之燥。以開發佛熱結滯者也。

小柴胡湯

柴胡去苗秤二兩　黃芩　甘草　人蔘各三分

半夏六錢泡五七次

右剉如麻豆大。抄五錢。生姜三片。棗三枚切。煎至半盞。濾去滓。温服。日三。小兒一服作三服。諸藥法同

涼膈散一名連翹飲子。

連翹一兩　山梔子　大黃　薄荷葉去毛　黃芩各半兩　甘草一兩半　朴硝一分

右爲粗末。每服二三錢。水一盞。蜜少許。或無蜜亦可。舊用竹葉。或亦不須煎至七分。濾去滓。温服。熱甚者。

可服四錢。亦有可服一二十錢者。治咽喉幷涎嗽。加桔梗一兩。荊芥穗半兩。咳而嘔者。本方加半夏半兩。每服生姜三片煎。衄嘔血者。加當歸芍藥各半兩。生地黃一兩。淋者加滑石四兩。茯苓一兩。風眩者。加川芎防風各半兩。石膏三兩。酒毒者加葛根一兩。斑疹痘瘡。加荊芥穗赤芍藥川芎防風桔梗各半兩。三歲兒可服七八錢。或熱甚黑陷腹滿喘急。小便赤澀而將死者。此一服更加大承氣湯約以下之。得利立甦。

凡言加者。皆自本方加也。但加者。每服五七錢以意加減調理。兩感傷寒下證。前後以退表裏之熱者。煎本方四五錢。調下益元散三四錢。其本方皆能治此諸證。但加卽爲效也。

白虎湯

知母 一兩半 甘草 一兩炙 粳米一合 石膏 四兩爲末

右剉麻豆大。抄五錢。水一盞。煎至六分。去滓。溫服無時。日三四服。熱甚者。服七八錢。至十餘錢。或眩或嘔。或咳者。加半夏半兩。陳皮半兩。每服用生姜三片煎服。或傷寒發汗不解。脈浮者。加蒼朮半兩。名曰蒼朮白虎湯。或發汗或下後煩渴口乾。或脈洪大。或徵惡寒者。或不可下者。或除可者之藥。外並宜加人參半兩以調之。名人參白虎湯。

五苓散

猪苓 去黑皮 茯苓 白朮 各半兩 桂去皴一分 澤瀉一兩

右爲細末。每服二三錢。熱湯調下。惡熱欲冷飲者。新水調下。或生姜湯調下。愈妙。或加滑石二兩。甚或

喘嗽咳煩心不得眠者。更加阿膠半兩泡。

桂苓甘露飲一名桂苓白朮散。

桂半兩　茯苓　白朮　各半兩　甘草　炙　澤瀉　石膏

寒水石各一兩　滑石二兩製如前

右爲極細末。熱湯調下三錢。欲冷飲者。新水調下。或生姜湯調下尤良。小兒服一錢。

白朮散

白朮　茯苓去皮　人蔘　藿香葉淨各半兩

甘草炙二兩半　木香一分　葛根一兩

右爲細末。白湯調下三錢。若煩渴者。加滑石二兩。病甚者。爲粗末。每服一兩半。水一大升。煎至七合。絞汁放冷。從意續續飲之。小兒尤宜。

四逆湯

甘草　炙　乾姜　各一分　附子半箇生去皮臍

凡用附子以半兩重者佳。小者力弱。大者性惡。非稱處方之宜也。世皆美其大者。未知古人之有則也。右剉麻豆大。用水兩盞。煮至一盞。絞汁分温二服。強實人二劑作三服。或畜熱極深者。手足厥冷。則不宜此方。當以下之也。

茯苓半夏湯

茯苓去皮 生姜 取汁各一分半夏一錢

右剉麻豆大。用水一盞。煎至四分。絞汁。下姜汁溫服。

半夏橘皮湯

半夏 泡如法 陳皮 湯浸洗去穰甘草 炙 人蔘 茯苓

黃芩去腐心各一分 葛根半兩 厚朴去皮各一分

右剉麻豆大。用水三盞。生姜一分。切。煎至一盞半。絞取汁。分四服。作一日食後溫服。

黃連解毒湯

黃連去須 黃蘗 黃芩 大梔子各半兩

右剉麻豆大。每服秤半兩。水一茶盞。煎至四分。絞取汁。溫服無時。日三四。以效爲度。每一二服效。或腹滿嘔吐。或欲作利者。每服加半夏三枚全。用厚朴二錢。剉。茯苓去皮。剉。水一盞半。生姜三片。煎至半盞。絞汁溫服。名曰半夏黃連解毒湯。或欲急下者。本方加大承氣湯一服。生姜煎如前法。以利爲度。一法爲細末。水研如小豆大。溫水下二十圓。治積熱勞欬瀉痢甚良。

瓜蒂散

瓜蒂 赤小豆等分

右爲細末。以香豉半合。豆豉也。水一盞半。煮取汁半盞。調下一錢匕。不吐加服。得快吐乃止。虛人不宜。

大柴胡湯

柴胡 去苗秤 大黃 各半兩 黃芩 芍藥 各一分 半夏二錢 枳實 三錢生用・小者是也・枳實不去穰爲效甚速下並同

右剉麻豆大分作三服每服水一盞生姜三片棗三枚煎至半盞絞取汁温服未利再服

大承氣湯

大黃 芒硝 朴硝有芒頭者亦得・厚朴去皺 枳實 各半兩

加甘草一兩是名三乙承氣湯

右剉麻豆大分一半用水一盞半生姜三片煎至六分納硝煎一二沸絞去滓熱服

凡煎藥須慢火煎沸卽下火爲一沸或言煎至幾分亦如此法煎不可強火耗去其水也

凡病熱鬱甚而冷服寒藥則病能拒藥多不能下故經曰寒因熱用未利再服熱甚者此一劑分大半作一服未利再服少半熱更甚者一劑都作一服熱勢甚者亦可併此二劑爲一服劑分劑爲劑爲一料・方得利而效者臨時消息以利爲度消息・謂損益多少也・

凡用藥多少倣於此耳

小承氣湯

大黃 半兩 厚朴三錢 枳實三錢

右剉如麻豆大作二服每服用水一盞生姜三片煎至半盞絞取汁熱服未利再服或微下者一劑分作二服或和胃氣不欲利者一劑分爲四五服

調胃承氣湯

甘草　大黃　芒硝　各半兩

右剉如麻豆大。分一半。用水一大盞。煎至半盞。絞去滓。納硝煎一二沸。熱服。不利再服。

十棗湯

芫花慢火炒變色・大戟　甘遂各等分

右爲散。細末　用水一盞。肥棗十枚。切開煮取汁半盞。調下半盞七。強實人服一錢七。以意加減。快利爲度。

桃仁承氣湯

桃仁湯去皮尖雙仁・用板槌碎・芒硝半兩　大黃六錢　桂去皴皮　甘草各三錢

右剉如麻豆大。分作三服。每服用水一盞。煎至半盞。下硝。絞取汁。熱服。日三。以微利爲度。

抵當圓

水蛭炒　蝱蟲炒各七枚　桃仁八粒　大黃一錢

右爲細末。蜜和作二圓。用水一小盞。煮一圓。至六分。溫服。瘀時血未下者。再服。

抵當湯

水蛭炒　蝱蟲炒去翅足各十枚　桃仁七枚　大黃一錢

右剉如麻豆大。分作二服。每用水一盞。煮半盞。絞去滓。溫服。未下再服。蛭・之吉・丁結二切・水蟥也・蝱・

莫庚切・

茵蔯湯

茵蔯蒿去莖・一兩・一名山茵蘊・川大黃半兩　山梔子七枚・小者十枚・右剉如麻豆大・用水兩盞半・慢火煮至一盞・絞取汁温服・六分・未利再服四分・以利爲度・勢甚者作一服・未利再作・以意加減・當下如爛魚肚・及膿血膠膿等物・及小便多出金色如皂角汁・或見證將欲發黃者・此一劑分作四服・每服調下五苓散三錢・凡治發黃亢越此法也・

世俗有傳烙黃而或愈者・此強實之人・素本中氣不衰・而及溼熱鬱之微者・烙之而誤中・強刼開發・得開氣血宣通・卽作汗而愈・或體質本虛・溼熱結甚・則刼發不開・而反致死者・不爲少矣・莫若仲景法・對證以藥致之・則免致強刼不開而反誤人生命也・及夫近世妄傳・有寒極陰黃・而內外極救其陽・爲害多矣・設若病微而誤中・開發得愈・亦以鮮矣・而傷生者不可勝言也・大抵凡諸黃者有二・一則溼熱氣而黃・萬物皆然・又如麥秀而黯雨溼熱過極・則黃疸者也・及水澇而天氣溼熱・則草木將死而色變黃者也・或病血液衰則虛燥熱太甚而身面痿黃者・猶亢旱而草木萎黃也・夫病燥熱而黃者・當退熱潤燥而已・此傷寒溼熱極甚而發黃者・開結退熱・雙利大小腑以除水溼・則利和而愈也・黯・於弇切・今作陰・

結胸而發黃者・同陷胸湯・各半服下之・或誤服巴豆熱毒圓藥下之・及損陰氣・遂協熱利不止・而發黃者・同大承氣各半服下之・亦有協熱利不止・更或結胸而發黃者・用茵蔯五分・同陷胸湯三分・大承氣

二分以下之或兩感發黃者本方加黃連解毒湯一服急下之或頭微汗小便利而微黃者溼熱微也宜此梔子蘗皮湯

大山梔子十五枚　甘草一錢　黃蘗半兩

右剉如麻豆大此劑則作二服每服水三盞煮至一盞絞取汁分三次作一日服

大陷胸湯

大黃芒硝各三錢　甘遂末三字七

右剉如麻豆大一劑分作二服每服用水一盞煮大黃至六分內消煎一二沸絞汁一字匕半温服未快利再服熱惡不利者以意加服

大陷胸圓

大黃半兩　葶藶三錢微炒　芒消一分　杏仁十二箇·草灰炒色變·

右大黃爲細末下葶藶杵再羅研杏仁消如泥和圓如彈子大每服一圓入甘遂末三字匕白蜜半匙水一盞煮至半盞温服當一宿許乃下未利再服

小陷胸湯

半夏四錢·湯洗·全用不剉·生姜二錢切　黃連二錢剉

括蔞實大者半箇·惟剉其殼·子則不剉·或但用其中子者非也·

右以水三盞煮括蔞取汁一盞半內餘藥煮至一盞絞取汁一盞分兩次温服以效爲度

大黃黃連瀉心湯

大黃　黃連　黃芩　各一分　一法加生姜一分甚良。

梔子湯

大梔子七枚剉碎豆豉半合

右以水兩盞煮梔子至一盞半。內豉煮至半盞。絞汁溫服。

凡加者。皆用梔子先煮。

或吐者。止後服。凡諸梔子湯。皆非吐人之藥。以其燥熱鬱結之甚。而藥頓攻之。不能開通。則鬱發而吐。因其嘔吐。發開鬱結。則氣通。津液寬行而已。故不須再服也。

梔子厚朴湯

大梔子七枚　厚朴半兩炙去粗皮　枳實二錢

右剉如麻豆大。以水一盞半。煮絞汁半盞溫服。

泛論

凡傷寒熱病下後。熱不退。下證尙在者。再三下之。以熱退爲度。雖熱退尙未痊愈者。隨證調之。凡下之前後。或大汗將出。或大汗已出。俗言好汗是言大汗或汗後煩渴及諸吐瀉雜病。一切煩渴者。須以細細飮之。渴未止者。頻頻時與。但不可過多。以成留飮不散者也。留飮一名水畜經曰積飮

夫留飮。謂水液留積畜聚於內而不溼潤傳化者也。夫腸胃燥熱太甚。則結滯而氣液不能宣通。故雖

飲而難以止其煩渴也。若以頓飲過多。則水溼過極而腸胃燥熱怫鬱。轉以加其水溼痞閉。故成留飲而心腹滿痛。或爲吐瀉也。

設若不與飲之。則燥熱轉甚。危而死矣。

夫腸胃之燥溼。猶地最潦。適當其宜。皆不可過與不及。凡治病之道。以調六氣陰陽。使無偏傾。各守其常平和而已。嗟夫。世俗或以妄爲冷水寒藥水損脾腎。隔卻大汗。但令中外俱熱。而欲望其作大汗者。或大汗欲出。腸胃燥熱煩渴。及汗已出。及慮水卻大汗不與水者。或氣弱久虛煩渴者。或吐瀉煩渴者。或產婦煩渴。皆以妄爲氣虛不可飲水也。此乃未知古人云。渴欲飲水。爲熱在裏也。若夫正氣既衰。邪熱燥甚而煩渴者。若非水液寒藥滋養。救其殘陰。退其邪熱。則陽熱暴甚而爲害速矣。況不與水而反以大毒熱藥燥之。寧無損者耶。且如酒之體者。水也。比之飲水則過能多飲而旋能消散之外。轉能發於渴者。以其苦熱養於心火。則陽盛陰衰而燥去水溼之體。故旋能消散而善多飲水也。其酒之善多飲者。以其酒之熱毒。若非復以水體勝之。則亦少飲疾醉者。強以飲多則燥熱太甚而多生病也。然酒力之熱。善消水體。復制酒力。以其熱力多於水體。故飲多即熱醉。而燥盡水體。勢力尚在。則燥熱煩渴而病於酒也。然酒之熱耗盡水體之外。尚能燥熱煩渴爲病。況病於燥熱太甚而煩渴及不與水者。豈不知其害耶。凡燥熱煩渴者。腸胃易爲怫鬱。常以退熱開結散水潤燥之藥調之。免致燥熱太甚。則怫鬱以成留飲。雖多飲亦不止其腸胃臟腑之燥熱煩渴。而或腸胃之內溼甚以成吐瀉也。涼膈白虎五苓及桂苓甘露之散類。隨證以調之也。

或成留飲諸病者。隨證燥之。

宜小青龍湯。五苓桂苓甘露黃連解毒湯。小陷胸大承氣之類。證本方論中。

戰汗

夫熱病大汗將出而反寒戰者。

古人以百病皆爲雜病。惟傷寒名曰大病。俗言汗病是也。（經言）大汗者。非謂邪熱自汗大出者也。乃陽氣怫熱鬱結。後得開通發散。宣通則蒸蒸而爲汗出。是謂大汗。言大病怫熱邪毒之氣鬱極迺發。以爲汗出。故曰大汗也。故經曰。大氣皆去。病得已矣。

表之正氣與邪熱并甚於裏。大熱亢極。而反兼水化制之。故反寒慄也。化謂造化之化也。

經曰。少陰所至爲驚。或惡寒戰慄譫妄。謂少陰君火熱氣之所至。而爲此等之病也。又經曰。諸禁鼓慄。如喪神守。皆屬於火。注云。熱之內作。然禁俗作噤。鼓振搖而動也。言禁泠振慄。反寒戰也。經曰。亢則害。承乃制。謂五行之道。微者當其本。此實其過亢。則反兼勝已之化以制其甚。老子云。天之道。其張弓乎。高者抑之。斯其道也。經云。水曰靜順。謂靜而自已無爲。但順物之氣味也。及方圓不與物爭。乃至柔順者也。水本寒。寒極則水冰如地。而能載物。又經曰。水發而雹雪。是水寒亢極而反似尅水之土化。是謂兼化也。故病寒極者。反堅滿也。夫土主溼。黔雲雨而安靜。雨溼極甚。則飄驟散落。是反兼風木制其土溼也。故經言。痙爲溼極而反似風強病也。　木主生榮而王於春。其氣溼。其本風。風大則反涼而毀折。是兼金化制其本也。故風病過極。則中外燥澁。皮膚皺揭。反氣運行之燥澁而筋脈癒緩。是反兼金化

也。金主於秋。而屬於陰。其氣涼。涼極則天氣清明。而萬物反燥。燥物莫若火。是金極反兼火化制之也。故爲病血液衰少。燥金之化極甚。則反熱也。燥物莫若火。夏月火盛。熱極甚則天氣曚昧。而萬物反潤。以出水液。林木流津。及體熱極而反出汗液。以火煉金。熱極而反化爲水。是火極而反兼水化制之也。故病熱極。則反出五涇。婦人帶下淋瀝。及厥逆身冷。或爲惡寒戰慄而或反冷痛也。俗以帶下直言冷病。及惡寒戰慄便爲陰寒者。俗醫未知此也。夫天道造化。病微必當其本化。寒見水化。熱見火化也。病甚者。反似勝已之化。如寒極反似涇土。熱極反似寒水之化也。嗟夫。百病之極甚者。其狀反似於已之相反者。俗醫不求其病之本氣。而百端擬疑。莫知眞源。不得已而但隨兼化之虛象。妄爲其治。反助其病而害於生命多矣。以至舉世皆云。病至危極之時。則陰陽反變。而無能辨別也。殊不知但以運氣造化之理推之。則設若千變萬化。而歸其要。則一也。何得有難易之二耶。故經曰。夫標本之爲道。要而博。小而大。可以言一而知百病之害。經又曰。善言始者。必念於終。善言近者。必知其遠。是則至數而道不惑。所謂明矣。故老子曰。不窺牖見天道。不出戶見天下。其出彌遠。其知彌少。蓋知要與不知要也。古聖曰。反常合道。謂古聖天理大道合同。而常俗之心。則有相反者也。然古聖道。不離於俗者。謂道包於俗而入俗也。又云。俗自離道者。常俗莫能合於道也。夫俗則有相而道本無形者。正如五行之變化。微則守常而本化自見。乃有相之俗。是化以自見也。甚則反似勝已之化。乃無相而反常合道。是謂變。以其取變於本化之相。而反見勝已之化也。變化之道多端。此則微甚外相之變化也。故仙經曰。大道似不肖。厚德若不足。即藏其本相於內。而反變化勝已之化於外。無相乃反常。合於道者也。卻以道眼觀

之。則求其內也。若但以俗眼觀其外。則逐相而遷。何由得其要也。故聖經所論天地變化。與道合同。而俗無所慊。但隨俗見編集方論。有乖其理。秖合俗心。致使後人皆由說。反自以爲明。而聖經之妙理。曹然罔究。病者無辜。竟罹橫夭。吁可痛者。且如經言。陽勝則熱。陰勝則寒。俗直謂陽熱之氣勝則發熱。陰寒之氣勝則發寒者。皆經之本旨也。此言表裏之陰陽。正氣之虛實。言正氣勝者爲不病。而不勝者爲病也。故經曰。陰勝則陽病。陽勝則陰病。陽勝則熱。陰勝則寒。是謂表陽之正氣爲不病。裏陰之正氣衰而爲受病也。裏陰之正氣勝爲不病。表陽之正氣衰而爲受病者也。此皆熱在表裏陰陽之部分者也。然病勝在裏。爲陽勝陰虛。病當發熱。故發熱爲病。熱在裏。陽勝陰虛。下之則愈。汗之則死者是也。表熱裏和。則病當惡寒。爲陰勝陽虛。汗之則愈。下之卽死者是也。故熱在表爲陰勝陽虛。而言惡寒之寒。則爲寒也。熱在裏爲陽勝陰虛。而言發熱之熱。則爲熱也。故傷寒表熱則惡寒。當汗。裏熱則發熱。而當下之。又經曰。重寒則熱。重熱則寒者。非謂病寒而極重反變也。此重言。當有兩重。惡寒則不惡寒。而惡熱。謂表熱惡寒爲一寒也。若裏之陽和正氣又出之於表。則又當有一重惡寒。是謂重寒。則反不惡寒。而爲發熱也。若表之正陽之氣與邪熱幷入於裏。則爲兩重發熱。則不發熱而後禁慄寒戰也。此反言陽和衞氣幷之於表陽分。則病氣之勝爲陽勝也。病氣與衞氣幷甚於裏之陰分。則爲陰勝也。此亦表裏之陰陽。正氣之與邪熱相併而以言爲虛實也。然邪熱在於表。則惡寒而熱。與裏之衞氣幷之於表。則反煩熱也。邪熱獨在於裏。則發熱而表之正氣與邪熱幷之於裏。則反寒戰也。故經云。陽虛則外寒。陰虛則內熱。此言不併者也。正氣虛而受邪熱。故言虛也。又曰。陽勝則外熱。陰勝則內寒。此言併者也。夫

表裏陰陽之分。受其邪熱之所在。其冲和正陽之衞氣。又爲邪熱相幷。而爲病之所。正氣轉實而不虛。故經言勝也。　故經瘧論云。陽氣幷於陰。當是之時。陽虛而陰實。外無氣故先寒慄也。陰氣逆極。則後出之陽。陽氣後併於外。則陰虛而陽實。故先熱而渴。又曰。幷於陽則陽勝。幷於陰則陰勝。陰勝則寒。陽勝則熱。是言表裏之陰陽。熱氣之虛實。非寒熱陰陽之虛實也。故經曰。病在陽則熱而脈燥。在陰則寒而脈靜。然氣幷於內而外無氣。故寒戰脈不能燥。甚而沈細欲絕。靜或不見也。　夫瘧者。邪熱與衞氣幷。則作發。而不幷則休止也。故經曰。衞氣相離。或病得休。衞氣集則復病也。故又云。陰虛而陽實。實則熱矣。衰則氣復反入。入則寒矣。此秖言表裏之陰陽。氣不幷者爲虛。而幷者爲實。其爲病之氣者。乃熱之一也。俗未明之。直以經言陰勝則寒。不明其經意。以病熱而反惡寒戰慄。便爲陰寒之病。誤之久矣。其陰寒之爲病者。脈遲細不須渴。小便清白。吐利腥穢。屈伸不便。厥逆禁固。體寒而不熱。不惡寒無戰慄者也。故經言人多病氣也。陽少陰多。故身寒如從水中出。又曰人有身寒湯火不能熱。厚衣不能温。不凍慄。此是陰寒爲病。而直云不凍慄寒冷也。夫陽動陰靜。故經云。戰慄動搖。爲陽火熱氣以爲病也。反寒冷者。亢則害。承乃制。是火熱極而反似寒水者也。故病寒戰者反渴。及雜病而害戰者。多有燥糞也。及夫平人冒寒而戰慄者。寒主閉藏。而外冒於寒。則裏熱怫鬱。而表之陽和衞氣。以外寒逼入於裏。則陽幷於陰而寒戰也。夫恐極而戰者。經言五志過極。則勞傷本藏。恐爲腎。故經曰。恐傷腎。然腎傷而虛。則心火自甚而熱也。又經曰。恐則氣下。然陽主出行舒榮。故心火之志。喜則身心放肆。而陰主收藏。故腎水之志。恐則身心收斂也。夫恐則腎虛心實而熱。正氣收藏。陷下於裏。亦是陽幷於陰而寒戰也。

夫酒噤而戰者腸胃酒熱未散身表酒力已消則陽熱易爲畜熱入裏故但冒於寒則陽幷於陰而寒戰也夫欲汗而寒戰者傷寒日深表證罷畜熱於裏則發熱也若表裏之正氣幷入裏則火熱無極而反寒戰也陰分陽熱之氣逆極而後出之陽則煩熱而大汗作也

世所謂交陽者非陰寒交熱以爲陽熱也乃佛熱畜之於裏而鬱極迺發則交傳出之於表之陽分是謂交陽而後作汗也或佛鬱過極而不能交出於表者是鬱極不發否極不泰卽正氣衰殘陰氣先絕則陽氣後竭而死矣夫欲汗而脈忽沉細而或不見者陽表正氣幷入於裏故也交陽而燥亂昏冒者裏熱鬱極迺發而欲出以佛鬱而陽之氣極不能出故氣亂則神昏而燥擾也　凡欲作汗無問病之微甚或以經新下者或下證未全者恆以涼膈散調之甚者宜黃連解毒湯或下後二三日或未經下腹滿煩渴脈沈實而有下證者三一承氣湯下之勢惡者加黃連解毒湯下之或已戰不快者或戰後汗出不快者或微戰數次經大戰而汗不出者乃幷之不甚而病之不速也通宜三一承氣湯或更加黃連解毒湯下之以散佛熱而開鬱結也　大法曰脈浮不可下傷寒病已有裏證脈沈之下裏證尙在脈漸浮至一二日汗不能出者裏證鬱發之不峻病已三乙承氣湯微下之凡此諸可下者或得利而汗便出者或服藥而佛鬱頓然開發先汗出而後利者或利性但隨汗出泄則氣和而愈更不利者說不快交不過而死者止由裏熱極甚而不能開發也故常以寒涼或下佛熱免致但以其作汗而爲邪熱耗絕陰氣而死也或不戰而汗出者衆不能盡而陽不幷陰也或戰而無汗而自愈者津液已衰以經發汗吐利或自汗吐利亡液過多則津液衰竭無由作汗但氣和而愈也

或不戰無汗而愈者。陽不并陰則不戰。津液已衰故無汗而已也。

世俗未知。而直以惡寒戰慄。名陽熱氣虛。陰寒實勝。因而爲治。誤人多矣。

受汗

夫大汗將出者。愼不可恨其煩熱。而外用水溼及風涼制其熱也。陽熱開發。將欲作汗而出者。若爲外風涼水溼所薄。則怫熱反入於裏而不能出泄。病多危極而死矣。亦不可恨其汗遲而厚衣壅覆。欲令大汗快而早出也。

怫熱已甚而鬱極迺發。其發之微則順。甚則逆。順則發易。逆則發難。病已怫熱作發。而煩熱悶亂。更以厚衣壅覆太過。則陽熱暴然太甚。陰氣轉衰而正氣不榮。則無由開發。卽燥熱喘滿。危而死矣。

汗後

雙解散　普解風寒暑溼。饑飽勞逸。憂愁思慮。恚怒悲恐。四時中外諸邪所傷。憶覺身熱頭疼。拘倦強痛。無問自汗無汗。增寒發熱。渴與不渴有甚。傷寒疫癘汗病。兩感風氣雜病。一切舊病作發。三日裏外並宜服之。設若感之勢甚。本難解者。常服三兩日間。亦漸減可。並無所損。或裏熱極甚。腹滿實痛。煩渴譫妄。須可急下者。以大承氣湯下之。三乙承氣湯亦妙也。或下後未愈。或證未全。或大汗前後逆氣。或汗後餘熱不解。或遺熱勞復。或感他人病氣。汗毒傳染。或中瘴氣。馬氣。羊氣。一切穢毒。并漆毒。酒食一切藥毒。及墜墮打撲傷損疼痛。或久新風眩頭疼。中風偏枯。破傷風。洗頭風。風癇病。或婦人產後諸疾。小兒驚風積熱。瘡瘍。疹痘。諸證。無問日數。但服之。周身中外氣血宣通。病皆除愈。是防風通聖散・加天水散各一半・

防風　川芎　當歸 切焙　芍藥　薄荷葉 淨
大黃 麻黃去根節・連翹　芒消 別研各半兩・石膏 別研
桔梗各一兩　滑石十五兩別研・白朮　山梔子
荊芥葉　甘草四兩剉濫　黃芩各一分

右爲麤末每服五錢六錢水一大盞半入葱白五寸鹽豉五十粒生姜三片煎至一盞濾汁去滓温服無時日三四服以效爲度常服三錢水一中盞煎六分絞汁温服不拘時兼夜四服設痊愈後更宜常服使病不再作新病不生並無過竟無問歲數乃平人常服之仙藥也凡人已衰老則腎水眞陰損虛卽風熱燥鬱甚精血涸竭枯燥而死但以此藥扶補滋潤者也嗟夫世俗反以妄傳中年以上火氣漸衰止是虛冷更無熱病誤服熱毒之劑害人無數豈知識病之法全憑勝證以別寒熱陰陽虛實豈可以中年上下爲則耶此藥除孕婦及產後月事經水過多并泄瀉者不宜服或治雜病亦宜治風熱極妙一名通氣防風散一名通解散

傷寒傳染論

夫傷寒傳染之由者因聞大汗穢毒以致神狂氣亂邪熱暴甚於內作發於外而爲病也則如西山記曰近穢氣而觸眞氣錢仲陽云步履糞穢之履無使近於嬰兒若聞其氣則令兒急驚風搐也孫眞人云乘馬遠行至暮當沐浴更衣然後方可近於嬰兒使不聞馬汗氣毒不然則多爲天吊急驚風搐也故剝死馬者感其毒氣而成馬氣丁黃之疾皆由聞其毒氣之所作也故聖惠方一法大汗出則懸藥於戶辟其

大汗穢毒。無使傷於人也。世以艾灸席隅者。皆其義也。多染親屬憂戚侍奉之人勞役者。由其神氣怯弱。易爲變亂故也。何以知傳染脈不浮者是也。若誤以熱藥解表。不惟不解其病反甚而危殆矣。其治之法。自汗宜以蒼朮白虎湯。無汗宜滑石涼膈散。熱散而愈。其不解者。適其表裏微甚。隨證治之。而與傷寒之法皆無異也。

王雲五主編

萬有文庫第二集

傷寒論

中華民國二十八年十二月初版

編者 葛雍

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者劉培基）

G一六一〇上 港